

貯法：室温保存  
使用期限：容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。  
注意：取扱い上の注意の項参照

承認番号	(61AM)3818
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

商品番号 N106

漢方製剤  
**コタロー**  
**温経湯** エキス細粒  
うん けい とう

〔組成・性状〕

(1) 組成

本剤12.0g中

日局 ハンゲ……………4.0g	日局 ケイヒ……………2.0g
日局 バクモンドウ……………4.0g	日局 ボタンピ……………2.0g
日局 トウキ……………3.0g	日局 カンゾウ……………2.0g
日局 センキュウ……………2.0g	日局 ゴシュコ……………1.0g
日局 シャクヤク……………2.0g	日局 ショウキョウ……………0.5g
日局 ニンジン……………2.0g	

上記の混合生薬より抽出した温経湯の水製乾燥エキス6.0gと  
日局 ゼラチン……………2.0g

を含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

(2) 製剤の性状

本剤は淡黄褐色～褐色の細粒で、特異なおいがあり、味は甘  
苦い。

識別コード：N106

〔効能・効果〕

冷え症で手掌がほてり、口唇が乾燥しやすいつぎの諸症に用い  
る。

指掌角皮症、更年期神経症、月経不順、月経過多、月経痛、頭  
痛、腰痛、帯下。

〔用法・用量〕

通常、成人1日12.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経  
口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

(1) 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 1) 著しく胃腸の虚弱な患者〔食欲不振、胃部不快感、悪心、  
下痢等があらわれることがある。〕
- 2) 食欲不振、悪心、嘔吐のある患者〔これらの症状が悪化す  
るおそれがある。〕

(2) 重要な基本的注意

- 1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮  
して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所  
見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2) 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や  
血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を  
中止すること。
- 3) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意  
すること。

(3) 相互作用

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
①カンゾウ含 有製剤	偽アルドステロン症があ らわれやすくなる。また、	グリチルリチン酸は 尿細管でのカリウム
②グリチルリ チン酸及び その塩類を 含有する製 剤	低カリウム血症の結果と して、ミオパチーがあら われやすくなる。(「重 大な副作用」の項参照)	排泄促進作用がある ため、血清カリウム 値の低下が促進され ることが考えられる。

(4) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査  
を実施していないため、発現頻度は不明である。

1) 重大な副作用

- ①偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリ  
ウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン  
症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の  
測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を  
中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- ②ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあ  
らわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四  
肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、  
カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

\*2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢等

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

(5) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するな  
ど注意すること。

(6) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこ  
とが望ましい。〔本剤に含まれるボタンピにより流早産の  
危険性がある。〕

(7) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少  
ない。〕

〔取扱い上の注意〕

- (1) 漢方製剤は吸湿しやすいので、湿気を避け、直射日光の当  
らない涼しい場所に保管してください。  
特に、ポリ瓶の場合はキャップを強く締めて保管してくだ  
さい。
- (2) 本剤は天然の生薬を原料としていますので、ロットにより  
色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

〔包 装〕

コタロー温経湯エキス細粒

ポリ瓶	500g
分包	4.0g×147包(588g)
	4.0g×42包(168g)

\*\*〔資料請求先〕

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部  
〒531-0071  
大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140  
(9:00～17:30/土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社  
大阪市北区中津2丁目5番23号