

貯 法：室温保存
使用期限：外箱等に表示

5 α -還元酵素Ⅱ型阻害薬
男性型脱毛症用薬

	0.2mg「SKI」	1mg「SKI」
承認番号	23000AMX00833000	23000AMX00834000
薬価収載	薬価基準未収載	薬価基準未収載
販売開始	2018年12月	2018年12月

劇薬、処方箋医薬品^{注)}

フィナステリド錠 0.2mg「SKI」
フィナステリド錠 1mg「SKI」







FINASTERIDE Tablets 0.2mg「SKI」・1mg「SKI」
フィナステリド錠

注)注意—医師等の処方箋により使用すること

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人
〔重要な基本的注意〕、「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照

【組成・性状】

品名	フィナステリド錠0.2mg「SKI」	フィナステリド錠1mg「SKI」
成分・含量	1錠中、フィナステリド0.2mg含有	1錠中、フィナステリド1mg含有
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、部分アルファ化デンプン、デンプングリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、カルナウバロウ	
性状	うすい赤色の円形のフィルムコーティング錠	うすい赤色の円形のフィルムコーティング錠
大きさ	直径：約7.1mm 厚さ：約3.4mm 重量：約137mg	直径：約7.1mm 厚さ：約3.4mm 重量：約137mg
外形	  	  
識別コード	フィナステリド 0.2 SKI	フィナステリド 1 SKI

【効能・効果】

男性における男性型脱毛症の進行遅延

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞

- 男性における男性型脱毛症のみの適応である。他の脱毛症に対する適応はない。
- 20歳未満での安全性及び有効性は確立されていない。
- 女性に対する適応はない。〔他社が海外で実施した閉経後女性の男性型脱毛症を対象とした12ヵ月間のプラセボ対照二重盲検比較試験(n=137)において、フィナステリドの有効性は認められなかった。¹⁾〕

【用法・用量】

男性成人には、通常、フィナステリドとして0.2mgを1日1回経口投与する。なお、必要に応じて適宜増量できるが、1日1mgを上限とする。

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

3ヵ月の連日投与により効果が発現する場合もあるが、効果が確認できるまで通常6ヵ月の連日投与が必要である。また、効果を持続させるためには継続的に服用すること。なお、増量による効果の増強は、確認されていない。本剤を6ヵ月以上投与しても男性型脱毛症の進行遅延がみられない場合には投薬を中止すること。また、6ヵ月以上投与する場合であっても定期的に効果を確認し、継続投与の必要性について検討すること。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

肝機能障害のある患者〔本剤は主に肝臓で代謝されるが、肝機能障害のある患者に投与した場合の安全性は確認されていない。〕

2. 重要な基本的注意

- 本剤の使用に際しては、患者に次の事項を説明すること。
- 本剤を妊婦に投与すると、本剤の薬理作用(DHT低下作用)により、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがある。〔妊婦、産婦、授乳婦等への投与〕の項参照
 - 本剤を分割・粉砕しないこと。
本剤が粉砕・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人は取扱わないこと。本剤はコーティングされているので、割れたり砕けたりしない限り、通常の取扱いにおいて有効成分に接触することはない。〔妊婦、産婦、授乳婦等への投与〕の項参照

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

肝機能障害：肝機能障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症	痒痒症、蕁麻疹、発疹、血管浮腫(口唇、舌、咽喉及び顔面腫脹を含む)
* 生殖器	睾丸痛、血精液症、男性不妊症・精液の質低下(精子濃度減少、無精子症、精子運動性低下、精子形態異常等) ^{注1)} 、リビドー減退 ^{注2)} 、勃起機能不全 ^{注2)} 、射精障害 ^{注2)} 、精液量減少
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、 γ -GTP上昇
その他	乳房圧痛、乳房肥大、抑うつ症状、めまい

注1) フィナステリド製剤の投与中止後に、精液の質が正常化又は改善されたとの報告がある。

注2)フィナステリド製剤の市販後において、投与中止後も持続したとの報告がある。

4. 高齢者への投与

他社が実施した前立腺肥大症患者を対象としたフィナステリド製剤(5mg)の臨床試験では、高齢者と非高齢者において副作用発現率に明らかな差は認められていない。しかし、一般に高齢者では生理機能が低下しているので注意すること。[高齢者における有効性は確立していない。]

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。[「重要な基本的注意」の項参照]
- (2)授乳中の婦人には投与しないこと。[本剤がヒト乳汁中へ移行するかは不明である。]

6. 小児等への投与

小児等に対する適応はない。[小児等に対する安全性及び有効性は確立していない。]

7. 臨床検査結果に及ぼす影響

他社が国内で実施した24歳から50歳の男性型脱毛症患者において、血清前立腺特異抗原(PSA)の濃度が約40%低下した。他社が実施した海外臨床試験において、高年齢層の前立腺肥大症患者へのフィナステリド投与により血清PSA濃度が約50%低下した。²⁾したがって、**本剤投与中の男性型脱毛症患者に対し前立腺癌診断の目的で血清PSA濃度を測定する場合は、2倍した値を目安として評価すること。**

8. 適用上の注意

- (1)調剤及び服用時：本剤を分割・粉碎しないこと。
本剤が粉碎・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人は取扱わないこと。
- (2)薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜に刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]
- (3)本剤は、食事の有無にかかわらず投与できる。

9. その他の注意

- (1)市販後において、フィナステリド製剤を投与された患者で男性乳癌が報告されている。フィナステリド長期投与と男性乳癌の発現との因果関係は不明である。

(参考)

海外で実施された、3,047例(平均年齢：63歳)の前立腺肥大症患者を対象としたプラセボ及び比較対照薬との4~6年間のフィナステリド製剤の臨床試験において、フィナステリド5mg投与群(本剤承認用量の5~25倍用量)で4例の乳癌の報告があったが、フィナステリド非投与群ではみられなかった。³⁾一方、別の3,040例(平均年齢：64歳)の前立腺肥大症患者を対象としたプラセボとの4年間のフィナステリド製剤の海外臨床試験では、プラセボ投与群において2例の乳癌の報告があったが、フィナステリド5mg投与群ではみられなかった。⁴⁾また、18,882例(平均年齢：63歳)の健康男性を対象としたプラセボとの7年間のフィナステリド製剤の海外臨床試験では、フィナステリド5mg投与群及びプラセボ投与群で各1例ずつ乳癌の報告があった。⁵⁾なお、海外のフィナステリド製剤の市販後において、フィナステリド1日5mgを投与された患者で男性乳癌が報告されている。

(2)海外で実施された、18,882例(平均年齢：63歳)の健康男性を対象としたフィナステリド5mg(本剤承認用量の5~25倍用量)又はプラセボを7年間投与する臨床試験⁵⁾において、Modified Gleason Score*8~10の高悪性度前立腺癌の発現率が、プラセボ投与群(1.1%)と比較して、フィナステリド5mg投与群(1.8%)で高かった(相対リスク1.70[95%信頼区間：1.23-2.34])との報告がある。⁶⁾

*組織学的悪性度の指標

- (3)他社が実施した海外臨床試験において、フィナステリド製剤投与により前立腺容積が減少したとの報告がある。
- (4)アカゲザルの妊娠20日から100日までフィナステリド120ng/kg/dayを毎日静脈内投与した場合でも雌雄胎児に異常所見は認められなかった(アカゲザルへの投与量は、フィナステリド1mgが投与された患者の1回の射精を介して女性が曝露される可能性のあるフィナステリド量の少なくとも750倍に相当する)。⁷⁾

【薬物動態】

<生物学的同等性試験>

1. フィナステリド錠0.2mg[SKI]

フィナステリド錠0.2mg[SKI]は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成24年2月29日付 薬食審査発0229第10号)に基づき、フィナステリド錠1mg[SKI]を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。⁸⁾

2. フィナステリド錠1mg[SKI]

フィナステリド錠1mg[SKI]と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(フィナステリド1mg)健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された(図、表)。⁹⁾




図 フィナステリドの血漿中濃度推移

表 薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→24h} (ng·h/mL)	Cmax (ng/mL)	tmax (h)	t _{1/2} (h)
フィナステリド錠1mg[SKI]	52.13±15.97	9.23±2.46	1.5±0.6	4.2±1.7
標準製剤(錠剤、1mg)	50.26±11.85	8.97±1.82	1.8±1.0	3.6±1.0

(Mean±S.D., n=19)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

【薬効薬理】

テストステロンをジヒドロテストステロンに変換する酵素5 α -レダクターゼのII型アイソザイムを阻害し、発毛作用を示すと考えられる。¹⁰⁾

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：フィナステリド (Finasteride)

化学名：(-)-*N-tert*-Butyl-3-oxo-4-aza-5 α -androst-1-ene-17 β -carboxamide


分子式：C₂₃H₃₆N₂O₂

分子量：372.55

性状：白色～微黄白色の結晶性の粉末である。

メタノール又はエタノール(99.5)に溶けやすく、水にほとんど溶けない。

構造式：



【取扱い上の注意】

<安定性試験>

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、75%RH、6ヵ月)の結果、フィナステリド錠0.2mg「SKI」及びフィナステリド錠1mg「SKI」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。¹¹⁾

【包装】

フィナステリド錠0.2mg「SKI」

PTP：30錠(10錠×3)

フィナステリド錠1mg「SKI」

PTP：30錠(10錠×3) 140錠(10錠×14)

バラ：61錠

【主要文献】

- 1) Price, V.H. et al. : J. Am. Acad. Dermatol., 43(5), 768 (2000)
- 2) Guess, H.A. et al. : J. Urol., 155(1), 3(1996)
- 3) McConnell, J.D. et al. : N. Engl. J. Med., 349(25), 2387 (2003)
- 4) McConnell, J.D. et al. : N. Engl. J. Med., 338(9), 557(1998)
- 5) Thompson, I.M. et al. : N. Engl. J. Med., 349(3), 215(2003)
- 6) Theoret, M.R. et al. : N. Engl. J. Med., 365(2), 97(2011)
- 7) Prahalada, S. et al. : Teratology, 55(2), 119(1997)
- 8) 小林化工株式会社・社内資料(生物学的同等性試験)
- 9) 小林化工株式会社・社内資料(生物学的同等性試験)
- 10) グッドマン・ギルマン薬理書 第12版、2375(2013)
- 11) 小林化工株式会社・社内資料(安定性試験)

【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

SKIファーマ株式会社 おくすり相談窓口

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-7 山葉ビル5F

TEL 03-6300-4076

販

売



SKIファーマ株式会社

東京都渋谷区代々木2-16-7

製造販売元



小林化工株式会社

福井県あわら市矢地5-15

(B.12.0) 002

