

承認番号	(61AM)第3630号
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年11月

## 漢方製剤

## 三和 半夏白朮天麻湯エキス細粒

はんげびやくじゅつてんまとう  
(半夏白朮天麻湯)

貯法：室温保存  
「取扱い上の注意」  
の項参照  
使用期限：容器又は外箱に表示

## [組成・性状]

- \* 1) 本品1日量(7.5g)中、下記の半夏白朮天麻湯水製エキス4.9gを含有する。

日局 ハンゲ 3.0g	シンキク 2.0g
日局 ビヤクジュツ 3.0g	日局 オウギ 1.5g
日局 チンピ 3.0g	日局 ニンジン 1.5g
日局 プクリョウ 3.0g	日局 タクシャ 1.5g
日局 バクガ 2.0g	日局 オウバク 1.0g
日局 テンマ 2.0g	日局 カンキョウ 1.0g
日局 ショウキョウ 0.5g	

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸を含有する。

- 2) 本品は褐色の細粒で、特異な芳香を有し、味は苦く、やや辛い。

## [効能又は効果]

平素より胃腸が虚弱で足が冷え、ときどき頭痛、めまいを起こし、激しいときは嘔吐を伴う症状：または食後に手足がだるくねむくなるもの、しばしば心下部に振水音を伴うもの次の諸症

胃アトニー症、胃下垂、胃神経症、低血圧症

## [用法及び用量]

通常、成人1日7.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

## [使用上の注意]

## (1) 重要な基本的注意

- 1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

## (2) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、蕁麻疹等

注1)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

## (3) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

## (4) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

## (5) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

## (6) その他の注意

湿疹、皮膚炎等が悪化することがある。

## \*\* [取扱い上の注意]

- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、色や味等に多少の差異を生じることがありますが、効果に変わりありません。

## [包装]

500g  
735g (2.5g×294包)

## [文献請求先] (お問い合わせ先)

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6  
TEL 050-3776-0358

## 製造販売元

三和生薬株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地6-1

## 発売元

大杉製薬株式会社 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2