

\* 2014年9月改訂（第3版）  
2009年8月改訂

劇 薬

生 薬 製 剤

# 日本薬局方 ブシ末 加エブシ末「三和生薬」

S-01

日本標準商品分類番号	875900
承認番号	22000AMX02002000
薬価収載	2008年12月
販売開始	2008年12月 ※1981年9月

※旧販売名による

## 貯法・取扱い上の注意

吸湿しやすいので、使用後は密栓し、直射日光を避け涼しいところに保管すること。

## 使用期限

ラベル又は外箱に表示。

本品は本邦産の附子を原料生薬として修治加工した服用しやすい製剤である。

## 【組 成】

本品は、ハナトリカブト又はオクトリカブトの塊根を高压蒸気処理により加工（ブシ末1）し、製したものである。

添加物として、トウモロコシデンプンを含有する。

## 【性 状】

本品は淡褐色を呈し、特異なおいがある。

\* 識別コード：S-01

## 【効能又は効果】

強心、鎮痛、利尿

## 【用法及び用量】

通常、成人1日0.5～1.5gを他剤と配合して服用する。

## 【使用上の注意】

### 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 体力の充実している患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕
- (2) 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者〔心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。〕

### 2. 重要な基本的注意

ブシを含む製剤との併用には注意すること。

### 3. 副作用

本品は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

頻度不明	
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等

### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量する等注意すること。

### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないが、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。

### 6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

【包 装】 500g、0.5g×300包・1,200包



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地6番地1

AI