

TRADE



MARK

日本薬局方

500ml

# オキシドール

## OXYDOLUM

### オキシドール「司生堂」

#### 司生堂製薬株式会社

東京都新宿区下落合2-12-10

SHISEIDO SEIYAKU CO., LTD.

#### 【薬効分類名】

外科用殺菌剤(消毒剤)

(日本製薬協会の承認) 972674  
【承認番号等】 10101A021298400  
(3005.987)(486)(2月)

#### 【組成】

本品は過酸化水素(H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>；34.01)2.5～3.5%を含有し、本品は適量に安定剤を含有し。

#### 【効能・効果】

○創傷・潰瘍の殺菌・清浄  
○外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症の殺菌、膿液及び分泌物の清掃・清浄、創の洗浄、  
○口内炎の殺菌

#### 【用法・用量】

(1) 創傷・潰瘍：原液のままあるいは2～3倍希釈して洗浄・洗浄する。  
(2) 耳鼻咽喉：原液のまま希釈、滴下あるいは2～10倍(耳科の場合)、3～5倍(鼻科、喉科)希釈して点鼻する。  
(3) 外科用殺菌剤として創傷・潰瘍、膿液及び分泌物の清掃・清浄、創の洗浄には原液又は2倍希釈して洗浄・拭拭する。口内炎の患部には10倍希釈して洗浄する。

#### 【使用上の注意】

- (1) 一般的注意  
長期貯蔵又は経年変化に使用しないこと。
- (2) 副作用  
目薬：使用により目膜刺激を軽減することがある。
- (3) 使用上の注意  
1) 目薬：使用により目膜刺激を軽減することがある。  
2) 眼に点入しないこと。  
3) 鼻科薬性の部位に使用する場合には、正常の部位は水でよく洗い流すこと。  
4) 外科用殺菌剤として使用する場合の希釈液は必ずしも、希釈液に使用する場合、希釈液を希釈して使用する必要はないこと。
- (4) その他  
長期大量経口投与によりオキシドールの発がん性が発見されたとの報告がある。

#### 【性状】

本品は無色透明の液で、においはないが、又はオゾンよりのにおいがある。

#### 【加齢以上の注意】

用法：規定した包装容器に入れ、30℃以下で保存する。

オキシドール「司生堂」

2020.0020 500ml



10133492727020111

オキシドール「司生堂」

0020 500ml



4 987523 020134 0020