

貯 法：室温保存(開封後は湿気を避けて保存すること)
使用期限：外装に表示の使用期限内に使用すること。

承認番号	22000AMX01065000
薬価収載	2008年7月
販売開始	2008年7月

※※日本薬局方

ポラプレジンク顆粒

亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ポラプレジンク顆粒15%「タイヨー」 POLAPREZINC

【組成・性状】

組 成	1g中：ポラプレジンク……150mg <添加物> カルメロースカルシウム、クエン酸二ナトリウム水和物、軽質無水ケイ酸、タルク、トウモロコシデンプン、ヒプロメロース、ポビドン、D-マンニトール
性 状	微黄白色の顆粒

【効能・効果】

胃潰瘍

【用法・用量】

通常、成人にはポラプレジンクとして1回75mgを1日2回朝食後及び就寝前に経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ペニシラミン製剤	同時に服用することにより、併用薬剤の効果を減弱するおそれがあるので、やむを得ず投与する場合には、同時に服用させないなど注意して投与すること。	同時投与した場合、本剤が併用薬剤とキレートを形成し、吸収を低下させる可能性がある。
レボチロキシナトリウム		

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

1) **肝機能障害、黄疸** AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTP、AI-Pの上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

※2) **銅欠乏症** 本剤は亜鉛を含有するため、亜鉛により銅の吸収が阻害され銅欠乏症を起こすことがある。栄養状態不良の患者で銅欠乏に伴う汎血球減少や貧血が報告されているため、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

以下の副作用が認められた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹、そう痒感、蕁麻疹
血液	好酸球増多、白血球減少、血小板減少
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、AI-P上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇
消化器	便秘、嘔気、腹部膨満感、嘔吐、胸やけ、下痢

注) このような場合には投与を中止すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では消化器機能が低下していることがあるので、減量(1日100mg)するなど患者の状態を観察しながら投与することが望ましい。

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与

すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

(2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳させないように注意すること。[動物実験(ラット)で乳汁中への移行がみられたとの報告がある。]

5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

※※【薬物動態】

溶出性¹⁾

ポラプレジンク顆粒15%「タイヨー」の溶出性は、日本薬局方に定められた規格に適合していることが確認されている。

【薬効薬理】

※※1. 作用機序

胃粘膜局所に直接作用すると考えられており、損傷部位に対する親和性が高く、長時間付着し、酸分泌機能に関与することなく、抗酸化作用、膜安定化作用により直接細胞保護作用を示し、さらに、創傷治癒促進作用により組織修復作用をもたらすと推察される。²⁾

2. 実験的胃粘膜損傷抑制作用

試験製剤と標準製剤(顆粒剤、15%)を用いて、ラットの無水エタノール誘発胃潰瘍モデルにおける胃粘膜損傷発生抑制効果を損傷係数により評価した結果、両製剤ともコントロール群に比較して有意な胃粘膜損傷の発生抑制効果が認められた。また、両製剤の結果に有意差は認められず、生物学的同等性が確認された。³⁾

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：ポラプレジンク(Polaprezinc)

※※化学名：catena - Poly [zinc- μ -[β -alanyl-L-histidinato (2-)-N,N',O':N^r]]

分子式：(C₉H₁₂N₄O₃Zn)_n

※※性状：白色～微黄白色の結晶性の粉末である。水、メタノール又はエタノール(99.5)にほとんど溶けない。希塩酸に溶ける。

※※構造式：



【取扱い上の注意】⁴⁾

安定性試験結果の概要

加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、ポラプレジンク顆粒15%「タイヨー」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包装】

ポラプレジンク顆粒15%「タイヨー」
分 包：0.5g×140包

【主要文献】

※※1) 大興製薬(株)社内資料(溶出試験)

※※2) 第十七改正日本薬局方第二追補解説書

3) 大興製薬(株)社内資料(生物学的同等性試験)

4) 大興製薬(株)社内資料(安定性試験)

【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

武田テバファーマ株式会社 武田テバDI センター

〒453-0801 名古屋市中村区太閤一丁目24番11号

TEL 0120-923-093

受付時間 9:00~17:30(土日祝日・弊社休業日を除く)

販売

武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

発売元

武田テバファーマ株式会社
名古屋市中村区太閤一丁目24番11号

製造販売元

大興製薬株式会社
埼玉県川越市下赤坂560番地1