



**2018年10月改訂 (第5版)
*2016年10月改訂

日本標準商品分類番号
8 7 2 3 9 9

消化管運動機能改善剤
日本薬局方 モサプリドクエン酸塩錠
モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「テバ」
モサプリドクエン酸塩錠 5mg「テバ」
Mosapride Citrate Tab. 2.5mg・5mg “TEVA”

| | | |
|------|---------------|---------------|
| | 錠2.5mg | 錠 5 mg |
| 承認番号 | 22400AMX01012 | 22400AMX01013 |
| 薬価収載 | 2012年12月 | |
| 販売開始 | 2012年12月 | |

貯 法：室温保存
使用期限：3年(外箱、ラベルに表示)

【組成・性状】

| | | |
|--------------|--|---|
| 販売名 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「テバ」 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」 |
| 有効成分 | 日局 モサプリドクエン酸塩水和物 | |
| 含 量 (1錠中) | 2.65mg (モサプリドクエン酸塩として2.5mg) | 5.29mg (モサプリドクエン酸塩として5mg) |
| 添加物 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸水和物、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、酸化チタン、D-ソルビトール、カルナウバロウ | |
| 性 状 | 白色のフィルムコーティング錠 | 白色の割線入りフィルムコーティング錠 |
| 外 形 | | |
| 大きさ | 直径：6.1mm 厚み：2.9mm 質量：約84mg | 長径：9.2mm 短径：4.7mm 厚み：4.1mm 質量：約135mg |
| 識別コード | KT MS・2.5 | KT MS・5 |

【効能・効果】

慢性胃炎に伴う消化器症状(胸やけ、悪心・嘔吐)

【用法・用量】

通常、成人には、モサプリドクエン酸塩として1日15mgを3回に分けて食前または食後に経口投与する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤を慢性胃炎に伴う消化器症状に用いる際には、一定期間(通常2週間)投与後、消化器症状の改善について評価し、投与継続の必要性について検討すること。
- (2) 劇症肝炎や重篤な肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、長期にわたって漫然と投与しないこと。なお、本剤投与中は、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、患者に対し、本剤投与後に倦怠感、食欲不振、尿濃染、眼球結膜黄染等の症状があらわれた場合は、本剤を中止し、医師等に連絡するよう指導すること。

2. 相互作用

併用注意(併用に注意すること)

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|--------------------------------------|--|---|
| 抗コリン作用を有する薬剤 アトロピン ブチルスコポラミン 等 | 本剤の作用が減弱する可能性があるため、抗コリン剤を服用する場合は、服用間隔をあけるなど注意すること。 | 本剤の消化管運動の促進作用は、コリン作動性神経の賦活により発現するため、抗コリン剤の併用により本剤の作用が抑制される。 |

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

劇症肝炎、肝機能障害、黄疸：劇症肝炎、著しいAST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTPの上昇等を伴う重篤な肝機能障害、黄疸があらわれることがあり、死亡に至った例もあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

| | 頻度不明 |
|-------|--|
| 過敏症 | 浮腫、蕁麻疹、発疹 |
| 血液 | 好酸球増多、白血球減少 |
| 消化器 | 下痢・軟便、口渇、腹痛、嘔気・嘔吐、味覚異常、腹部膨満感、口内しびれ感(舌、口唇等を含む) |
| 肝臓 | ALT(GPT)、AST(GOT)、Al-P、 γ -GTP、ビリルビンの上昇 |
| 循環器 | 心悸亢進 |
| 精神神経系 | めまい・ふらつき、頭痛 |
| その他 | 倦怠感、中性脂肪の上昇、振戦 |

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では腎機能、肝機能等の生理機能が低下しているため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお、慢性胃炎に伴う消化器症状に用いる

際に、副作用が発現した場合には、減量(例えば1日7.5mg)するなど適切な処置を行うこと。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕
- (2) 授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合は、授乳を中止させること。〔動物実験(ラット)で乳汁への移行が報告されている。〕

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

7. 適用上の注意

薬剤交付時：

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

8. その他の注意

げっ歯類に臨床通常用量の100~330倍(30~100mg/kg/日)を長期間経口投与した試験(ラット104週間、マウス92週間)において、腫瘍(肝細胞腺腫及び甲状腺濾胞性腫瘍)の発生率の上昇が認められた。

【薬物動態】


1. 生物学的同等性試験¹⁾

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「テバ」又はモサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」と標準製剤をクロスオーバー法により、それぞれ1錠(モサプリドクエン酸塩として2.5mg又は5mg)を健康成人男子に空腹時単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。

○モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「テバ」

| | 判定パラメータ | | 参考パラメータ | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| | AUC _{0~8} (ng・hr/mL) | Cmax (ng/mL) | tmax (hr) | t _{1/2} (hr) |
| モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「テバ」 | 17.81 ±6.78 | 9.42 ±3.71 | 0.67 ±0.17 | 2.11 ±0.64 |
| 標準製剤 (錠剤、2.5mg) | 19.56 ±7.85 | 9.67 ±3.44 | 0.69 ±0.31 | 1.82 ±0.30 |

(Mean±S.D., n=16)




モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「テバ」(1錠)投与後の血漿中濃度の推移

○モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」

| | 判定パラメータ | | 参考パラメータ | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| | AUC _{0~8} (ng・hr/mL) | Cmax (ng/mL) | tmax (hr) | t _{1/2} (hr) |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」 | 32.13 ±9.50 | 16.45 ±4.94 | 0.67 ±0.25 | 1.87 ±0.22 |
| 標準製剤 (錠剤、5mg) | 34.75 ±14.25 | 17.35 ±8.86 | 0.91 ±0.48 | 1.79 ±0.24 |

(Mean±S.D., n=15)



モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」(1錠)投与後の血漿中濃度の推移

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2. 溶出挙動²⁾

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「テバ」及びモサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」は、日本薬局方医薬品各条に定められたモサプリドクエン酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

【薬効薬理】

モサプリドクエン酸塩水和物は、選択的セロトニン5-HT₄受容体作用薬で、消化管壁内神経叢に存在する5-HT₄受容体を刺激し、アセチルコリン遊離の増大を介して消化管運動促進及び胃排出促進作用を示すと考えられている³⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：モサプリドクエン酸塩水和物、Mosapride Citrate Hydrate (JAN)

〔別名〕クエン酸モサプリド

化学名：4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[(2RS)-4-(4-fluorobenzyl)morpholin-2-yl]methyl]benzamide monocitrate dihydrate

分子式：C₂₁H₂₅ClFN₃O₃・C₆H₈O₇・2H₂O

分子量：650.05

構造式：



性状：白色～帯黄白色の結晶性の粉末である。

N,N-ジメチルホルムアミド又は酢酸(100)に溶けやすく、メタノールにやや溶けにくく、エタノール(99.5)に溶けにくく、水にほとんど溶けない。N,N-ジメチルホルムアミド溶液(1→20)は旋光性を示さない。

【取扱い上の注意】

安定性試験⁴⁾

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「テバ」及びモサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包装】

- モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「テバ」：
100錠(PTP10錠×10)
モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」：
100錠(PTP10錠×10)
500錠(PTP10錠×50)
1050錠(PTP21錠×50)
1000錠(バラ)

【主要文献】

- 1) 武田テバ薬品株：社内資料(生物学的同等性試験)
- 2) 武田テバ薬品株：社内資料(溶出試験)
- **3) 第十七改正日本薬局方解説書, 廣川書店 2016; C-5558
- 4) 武田テバ薬品株：社内資料(安定性試験)

*【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。
武田テバ薬品株式会社 武田テバDIセンター
〒453-0801 名古屋市中村区太閤一丁目24番11号
TEL 0120-923-093
受付時間 9:00~17:30 (土日祝日・弊社休業日を除く)

* 販 売 **武田薬品工業株式会社**
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

* 発売元 **武田テバファーマ株式会社**
名古屋市中村区太閤一丁目24番11号

* 製 造 **武田テバ薬品株式会社**
* 販売元 大阪市中央区道修町四丁目1番1号