

処方箋医薬品<sup>(注)</sup>

降圧利尿剤  
日本薬局方 メフルシド錠  
**バイカロン<sup>®</sup>錠 25mg**  
BAYCARON<sup>®</sup> TABLETS 25mg


承認番号	22000AMX02286
薬価収載	2008年12月
販売開始	1975年10月
再評価結果	1998年3月
効能追加	1976年11月

貯 法：室温保存  
使用期限：外箱に表示の使用期限内に使用すること  
注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

**【禁忌】(次の患者には投与しないこと)**

- (1) 無尿、急性腎不全の患者〔腎機能を更に悪化させるおそれがある。〕
- (2) 体液中のナトリウム・カリウムが明らかに減少している患者〔低ナトリウム血症、低カリウム血症等の電解質失調を悪化させるおそれがある。〕
- (3) 既往にチアジド系薬剤又はその類似化合物(例えばクロルタリドン等のスルホンアミド誘導体)に対する過敏症を起こした患者〔皮疹、光線過敏症があらわれるおそれがある。〕
- (4) 肝性昏睡の患者〔血中アンモニア濃度を上昇させ症状を悪化させるおそれがある。〕

**【組成・性状】**

有効成分 (1錠中)	日局 メフルシド 25mg		
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、メチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム		
性状・剤形	白色・素錠(割線入り)		
外形			
規格	直径(mm) 7.1	厚さ(mm) 2.5	重量(mg) 130
識別コード	Y-BA25		

**【効能・効果】**

- 高血圧症(本態性、腎性)
- 下記の慢性浮腫における利尿  
心性浮腫、腎性浮腫、肝性浮腫

**【用法・用量】**

メフルシドとして、通常成人1日25~50mgを経口投与する。この1日量を朝1回投与するか、または朝、昼の2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

ただし、高血圧症に用いる場合には少量から投与を開始して徐々に増量すること。また、悪性高血圧に用いる場合には、通常、他の降圧剤と併用すること。

**【使用上の注意】**

**1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)**

- (1) 肝硬変の患者又は強心配糖体の治療を受けている患者〔連用により低カリウム血症等の電解質失調があらわれることがあるので、このような場合には十分なカリウム補給を行うなどの処置を行うこと。〕

- (2) 心疾患のある高齢者、重篤な冠硬化症又は脳動脈硬化症のある患者〔急激な利尿があらわれた場合、急速な血漿量減少、血液濃縮を来し、血栓塞栓症を誘発するおそれがある。〕
  - (3) 重篤な腎障害のある患者〔低カリウム血症を起こすおそれがある。〕
  - (4) 肝疾患・肝機能障害のある患者〔肝機能障害を悪化させることがある。〕
  - (5) 本人又は両親、兄弟に痛風、糖尿病のある患者〔高尿酸血症、高血糖症を来し、痛風、血糖値の悪化や痛風が顕性化するおそれがある。〕
  - (6) 下痢、嘔吐のある患者〔電解質失調があらわれるおそれがある。〕
  - (7) 高カルシウム血症、副甲状腺機能亢進症の患者〔カルシウム貯留作用があり副甲状腺腫になるおそれがある。〕
  - (8) ジギタリス剤、グリチルリチン製剤、糖質副腎皮質ホルモン剤又はACTHの投与を受けている患者〔「相互作用」の項参照〕
  - (9) 乳児〔「小児等への投与」の項参照〕
  - (10) 減塩療法時の患者〔低ナトリウム血症等の副作用が起るおそれがある。〕
  - (11) 高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕
  - (12) 交感神経切除後の患者〔本剤の降圧作用が増強されるおそれがある。〕
- (3)~(11)項は副作用の項参照

**2. 重要な基本的注意**

- (1) 本剤の利尿効果は急激にあらわれることがあるので、電解質失調、脱水に十分注意し、少量から投与を開始して、徐々に増量すること。
- (2) 連用する場合、電解質失調があらわれることがあるので定期的に検査を行うこと。
- (3) 夜間の休息が特に必要な患者には、夜間の排尿を避けるため、昼間に投与することが望ましい。
- (4) 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

**3. 相互作用**

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
バルビツール酸誘導体	起立性低血圧を増強することがある。	これらの薬剤の中樞抑制作用と利尿剤の降圧作用による。
あへんアルカロイド系麻薬		あへんアルカロイドの大量投与で血圧下降があらわれることが報告されている。
アルコール(飲酒)		アルコールは心血管系の抑制作用があり、利尿剤の降圧作用を増強する。

昇圧アミン (ノルアドレナリン等)	昇圧アミンの作用を減弱させるおそれがある。手術前の患者に使用する場合には一時休薬等の処置を行うこと。	ノルアドレナリン等の昇圧アミンに対する血管壁の反応性を低下させる可能性が考えられる。
ツボクラリン及びその類似作用物質 (ツボクラリン塩化物塩酸塩水和物等)	麻痺作用を増強するおそれがある。手術前の患者に使用する場合には一時休薬等の処置を行うこと。	チアジド系利尿剤は低カリウム血症を起こすことによりツボクラリンの神経遮断作用を増強すると考えられている。
他の降圧剤 (ACE阻害剤、β遮断剤等)	降圧作用を増強させ、血圧低下を起こすおそれがあるので、降圧剤の用量調節等に注意すること。	β遮断剤、ACE阻害剤、Ca拮抗剤、α遮断剤、クロニジン、メチルドパとの併用により、降圧作用が増強される。
ジギタリス剤 (ジゴキシン、ジトキシシン)	不整脈等を起こすおそれがある。血清カリウム値に十分注意すること。	低カリウム血症を起こし、ジギタリスの心臓毒性を増強する可能性が考えられる。
グリチルリチン製剤	血清カリウム値の低下があらわれやすくなる。	グリチルリチン製剤は低カリウム血症を主徴とした偽アルドステロン症を引き起こすことがある。したがって両剤の併用により低カリウム血症を増強する可能性がある。
糖質副腎皮質ホルモン剤 ACTH	低カリウム血症を起こすおそれがある。	糖質副腎皮質ホルモンを併用するとカリウム排泄が促進され、低カリウム血症を起こすことがある。
糖尿病用剤 (SU剤、インスリン)	糖尿病用剤の作用を著しく減弱するおそれがある。	カリウム欠乏時には、血糖上昇反応に対して膵臓のβ細胞のインスリンを放出する能力が低下すると考えられている。また、末梢でのインスリン作用が影響を受けるとの考えもある。
リチウム	リチウム中毒(手指の振戦、せん妄、痙攣等)を起こすおそれがある。血清リチウム濃度に注意すること。	チアジド系利尿剤の長期投与ではナトリウムの近位尿管再吸収が代償的に増加し、その結果、リチウムの再吸収も同様に増加するといわれている。
コレステラミン	利尿降圧効果を減弱するおそれがある。	コレステラミンの吸着作用により、利尿剤の吸収が阻害される。
非ステロイド系消炎鎮痛剤 (インドメタシン等)	利尿降圧効果を減弱するおそれがある。	非ステロイド系消炎鎮痛剤のプロスタグランジン合成抑制による水・Na体内貯留傾向が、本剤の水・Na排泄作用に拮抗するためと考えられている。

#### 4. 副作用

総症例数10,013例中307例(3.07%)381件の副作用が報告されている。主な副作用は食欲不振、胃部不快感等の胃腸症状75件(0.75%)、尿酸値の上昇95件(0.95%)、低カリウム血症66件(0.66%)等であった。(国内文献等に基づいて集計一再審査対象外)

#### (1) 重大な副作用

1) 低ナトリウム血症(頻度不明): 倦怠感, 食欲不振, 嘔気, 嘔吐, 痙攣, 意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には, 投与を中止するなど, 直ちに適切な処置を行うこと。

2) 低カリウム血症(頻度不明): 倦怠感, 脱力感, 不整脈等を伴う低カリウム血症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には, 投与を中止するなど, 直ちに適切な処置を行うこと。

#### (2) 重大な副作用(類薬)

間質性肺炎・肺水腫: 類似化合物(ヒドロクロロチアジド)で報告されているのでこのような副作用が発現した場合には減量又は休薬等の適切な処置を行うこと。

#### (3) その他の副作用

種類	頻度	0.1~5%未満	0.1%未満	頻度不明
肝臓 <sup>注)</sup>			AST(GOT), ALT(GPT)の上昇	LDHの上昇
代謝異常 <sup>注)</sup>	高尿酸血症, 高血糖症			低クロル性アルカローシス
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹		光線過敏症	
消化器	悪心, 嘔吐, 胃部不快感, 食欲不振	便秘, 下痢, 口内炎, 口渇		
精神神経系	眩暈		頭重感	
循環器	起立性低血圧			
その他	脱力感			紫斑

注) 異常が認められた場合には, 投与を中止すること。

#### 5. 高齢者への投与

高齢者には, 次の点に注意し, 少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

- 1) 高齢者では急激な利尿は血漿量の減少を来し, 脱水, 低血圧等による立ちくらみ, めまい, 失神等を起こすことがある。
- 2) 特に心疾患等で浮腫のある高齢者では急激な利尿は急速な血漿量の減少と血液濃縮を来し, 脳梗塞等の血栓塞栓症を誘発するおそれがある。
- 3) 高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされている。(脳梗塞等が起こるおそれがある。)
- 4) 高齢者では, 低ナトリウム血症, 低カリウム血症があらわれやすい。

#### 6. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳婦には治療上の有益性が危険性を上回る場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与による胎児, 新生児に対する安全性及び授乳中の投与による乳児に対する安全性は確立していない。〕

#### 7. 小児等への投与

乳児は電解質のバランスがくずれやすいため慎重に投与すること。

#### 8. 適用上の注意

##### 薬剤交付時:

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により, 硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し, 更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

## 【薬物動態】

### 1. 血漿中濃度〈参考〉外国人のデータ

健康成人(オランダ人 8 例)にメフルシド 25mg 又は 50mg を経口投与した場合、吸収は良好で、最高血漿中濃度は 25mg 投与群で 2 及び 2.5 時間後、50mg 投与群で 1.5~5.5 時間後に得られた。血漿中濃度の半減期は 25mg 投与群で 10.4 及び 12.5 時間、50mg 投与群で 2.9~11.4 時間であった<sup>1)</sup>。

健康成人 8 人、25mg 又は 50mg 単回経口投与

投与量	例数	t <sub>max</sub> (h)	t <sub>1/2</sub> (h)
25mg	2	2, 2.5	10.4, 12.5
50mg	6	1.5~5.5	2.9~11.4

### 2. 代謝〈参考〉外国人のデータ

健康成人(オランダ人)にメフルシド 50mg を経口投与した場合の尿中主代謝物は、ラクトン型とそれが開環したヒドロキシカルボン酸型である。なお、これら代謝物の排泄半減期はメフルシドより遅く、またメフルシドと同様の作用を有している<sup>1)</sup>。

## 【臨床成績】

二重盲検比較試験を含む 1,022 例について実施された臨床試験の概要は次のとおりである<sup>2-7)</sup>。(有効率は“有効と認められるもの”以上を集計)

疾患名	有効率
本態性高血圧症	67.6% (605例/895例)
腎性高血圧症	68.9% ( 51例/ 74例)
心性浮腫、腎性浮腫、肝性浮腫	62.3% ( 33例/ 53例)

なお、二重盲検比較試験によって、本態性高血圧症、心性浮腫、腎性浮腫、肝性浮腫に対する本剤の有効性が確認されている。

## 【薬効薬理】

### 1. ヒトでの作用

#### (1) 降圧作用

- 1) 高血圧症例で循環動態へ及ぼす影響をみた場合、投与初期には心拍出量(循環血漿流量)の減少、その後は全末梢血管抵抗の減弱が認められている<sup>8)</sup>。
- 2) 高血圧症例で食塩摂取による血管反応性亢進の抑制<sup>9)</sup> 及び交感神経終末におけるノルアドレナリン再吸収低下の改善が認められている<sup>10)</sup>。

#### (2) 利尿作用

健康成人(アメリカ人)に経口投与した場合、利尿作用の発現は緩徐で、かつ持続的であり、Na<sup>+</sup>に対して選択的に作用し、尿中Na/K値を高値に維持する<sup>11)</sup>。

### 2. 動物での作用

#### (1) 降圧作用

- 1) 腎性高血圧ラットを用いた実験で降圧作用が認められており、その作用は持続的である。また、DOCA高血圧ラットにおいても降圧作用が認められている<sup>12,13)</sup>。
- 2) SHRを用いた実験で食塩負荷による血圧上昇を抑制することが認められている<sup>13)</sup>。

#### (2) 利尿作用

ラットを用いた実験で、ヘンレ係蹄及び遠位尿細管におけるNa<sup>+</sup>及び水の再吸収を抑制すると考えられている<sup>14)</sup>。

## 【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：メフルシド、Mefruside (JAN)

化学名：4-Chloro-N-methyl-N-[(2*RS*)-2-methyltetrahydrofuran-2-ylmethyl]-3-sulfamoylbenzenesulfonamide

分子式：C<sub>13</sub>H<sub>19</sub>ClN<sub>2</sub>O<sub>5</sub>S<sub>2</sub>

分子量：382.88

構造式：



及び鏡像異性体

性状：白色の結晶性の粉末である。N,N-ジメチルホルムアミドに極めて溶けやすく、アセトンに溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、エタノール(95)にやや溶けにくく、水にほとんど溶けない。N,N-ジメチルホルムアミド溶液(1→10)は旋光性を示さない。

融点：149~152℃

## \*\*【包装】

バイカロン錠25mg：100錠(10錠×10)

## 【主要文献及び文献請求先】

### 1. 主要文献

- 1) Fleuren, H. L. J. et al. : Eur. J. Clin. Pharmacol. 1980 ; 17 : 59-69
- 2) 村上元孝 他：医学のあゆみ 1976 ; 99(9) : 710-726
- 3) 藤田嘉一 他：新薬と臨床 1974 ; 23(1) : 57-67
- 4) 三條貞三 他：診療と新薬 1973 ; 10(11) : 2545-2565
- 5) 稲垣義明 他：新薬と臨床 1977 ; 26(2) : 194-209
- 6) 元田 憲 他：新薬と臨床 1977 ; 26(2) : 220-224
- 7) 伊藤敬一 他：新薬と臨床 1980 ; 29(8) : 1269-1276
- 8) 木川田隆一 他：診療と新薬 1976 ; 13(9) : 1935-1946
- 9) 山崎英彰 他：脈管学 1982 ; 22(6) : 688-688
- 10) 木村 忍 他：高血圧 1982 ; 5(1) : 22-22
- 11) Santos, R. J. et al. : Int. J. Clin. Pharmacol. 1970 ; 3(1) : 14-20
- 12) 岡 太一 他：基礎と臨床 1973 ; 7(5) : 1040-1051
- 13) 矢岡 修 他：基礎と臨床 1984 ; 18(3) : 799-806
- 14) Meng, K. et al. : Arzneim.-Forsch. Drug Res. 1967 ; 17 : 659-671

### 2. 文献請求先

田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター  
〒541-8505 大阪市中央区道修町 3-2-10  
電話 0120-753-280



製造販売元

田辺三菱製薬株式会社  
大阪市中央区道修町3-2-10

®Bayer AG, Germany登録商標