

承認番号	錠0.25mg	22800AMX00230000
	錠1mg	22800AMX00231000
	錠2mg	22800AMX00232000
薬価収載	2016年6月	
販売開始	2016年6月	

ドパミンD<sub>2</sub>受容体系作動薬

ロピニロール錠0.25mg「JG」  
ロピニロール錠1mg「JG」  
ロピニロール錠2mg「JG」

劇薬  
処方箋医薬品<sup>(注)</sup>

(ロピニロール塩酸塩錠)

【貯法】  
室温保存、気密容器  
【使用期限】  
2年間(外箱に表示の  
期限内に使用すること。)

【警告】

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。  
(「2. 重要な基本的注意」及び「4. 副作用」の項参照)

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- (1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人(「6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)

【組成・性状】

販売名	ロピニロール錠 0.25mg「JG」	ロピニロール錠 1mg「JG」	ロピニロール錠 2mg「JG」
成分・含量 (1錠中)	ロピニロール塩酸塩 0.285mg (ロピニロールとして0.25mg)	ロピニロール塩酸塩 1.14mg (ロピニロールとして1mg)	ロピニロール塩酸塩 2.28mg (ロピニロールとして2mg)
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール400、酸化チタン、タルク	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール400、酸化チタン、青色1号、黄色5号、タルク	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール400、酸化チタン、三酸化鉄、タルク
剤形・性状	白色のフィルムコーティング錠	淡黄緑色のフィルムコーティング錠	淡紅白色のフィルムコーティング錠
外形			
大きさ(mm)	直径: 7.2 厚さ: 2.9	直径: 7.6 厚さ: 3.3	直径: 7.7 厚さ: 3.3
重量(mg)	124	155	155
識別コード	JG C54	JG C55	JG C56

【効能・効果】

パーキンソン病

【用法・用量】

通常、成人にはロピニロールとして1回0.25mg、1日3回(1日量0.75mg)から始め、1週毎に1日量として0.75mgずつ増量し、4週目に1日量を3mgとする。以後経過観察しながら、必要に応じ、1日量として1.5mgずつ1週間以上の間隔で増量し、維持量(標準1日量3~9mg)を定める。いずれの投与量の場合も1日3回に分け、経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減するが、ロピニロールとして1日量15mgを超えないこととする。

【用法・用量に関連する使用上の注意】

- (1)本剤の投与は「用法・用量」に従い少量から始め、消化器症状(悪心、嘔吐等)、血圧等の観察を十分に行い、忍容性をみながら慎重に増量し患者ごとに適切な維持量を定めること。また、本剤投与中止後再投与する場合にも少量から開始することを考慮すること。
- (2)一般に空腹時投与において悪心、嘔吐等の消化器症状が多く発現する可能性があるため、食後投与が望ましい。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1)幻覚、妄想等の精神症状又はそれらの既往のある患者[症状が増悪又は発現しやすくなることがある。]
- (2)重篤な心疾患又はその既往歴のある患者[本剤は薬理作用から心拍数低下を起こす可能性がある。]
- (3)低血圧症の患者[症状が悪化することがある。]
- (4)重度の腎障害(クレアチニンクリアランス30mL/分未満)のある患者[本剤は主として腎臓で排泄される。また、これらの患者での使用経験はなく安全性は確立されていない。なお、血液透析を受けている患者に対して、透析による用量調節の必要性はない。]
- (5)肝障害のある患者[本剤は主として肝臓で代謝される。また、これらの患者での使用経験はなく安全性は確立されていない。]
- (6)高齢者(「5. 高齢者への投与」の項参照)

2. 重要な基本的注意

- (1)突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されていることから、患者には突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。なお、海外において突発的睡眠を起こした症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後初めて発現した例も報告されている。(「4. 副作用」の項参照)
- (2)起立性低血圧がみられることがあるので、本剤の投与は少量から始め、めまい、立ちくらみ、ふらつき等の起立性低血圧の徴候や症状が認められた場合には、減量、休薬又は投与中止等の適切な処置を行うこと。
- (3)本剤を他の抗パーキンソン剤と併用した場合、ジスキネジア、幻覚、錯乱等の副作用が発現しやすくなる可能性があるため、これらの副作用があらわれた場合には減量、休薬又は投与中止等の適切な処置を行うこと。(「4. 副作用」の項参照)
- (4)本剤の減量、中止が必要な場合は、漸減すること。急激な減量又は中止により、高熱、意識障害、高度の筋硬直、不随意運動、ショック症状等の悪性症候群があらわれることがある。また、ドパミン受容体作動薬の急激な減量又は中止により、薬剤離脱症候群(無感情、不安、うつ、疲労感、発汗、疼痛等の症状を特徴とする)があらわれることがある。(「4. 副作用」の項参照)
- (5)レボドパ又はドパミン受容体作動薬の投与により、病的賭博(個人的生活の崩壊等の社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、持続的にギャンブルを繰り返す状態)、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等の衝動制御障害が報告されているので、このような症状が発現した場合には、減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。また、患者及び家族等にこのような衝動制御障害の症状について説明すること。

### 3. 相互作用

本剤は主にCYP1A2により代謝される。

#### 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ドパミン拮抗剤 抗精神病薬 メトクロプラ ミド スルピリド等	本剤の作用が減弱することがある。	本剤はドパミン作動薬であり、併用により両薬剤の作用が拮抗するおそれがある。
CYP1A2阻害作用を有する薬剤 シプロフロキサシン エノキサシン フルボキサミン等	シプロフロキサシンとの併用によりCmax及びAUCがそれぞれ約60%及び84%増加したことが報告されている。 本剤投与中にこれらの薬剤を投与開始又は中止する場合は、必要に応じて本剤の用量を調整すること。	これらの薬剤のCYP1A2阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
エストロゲン含有製剤	高用量のエストロゲンを投与した患者で本剤の血中濃度上昇がみられたとの報告があるので、本剤投与中に高用量のエストロゲンを投与開始又は中止する場合は、必要に応じて本剤の用量を調整すること。	機序不明

### \* 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

#### (1) 重大な副作用 (頻度不明)

- 1) 突発的睡眠、極度の傾眠：前兆のない突発的睡眠、極度の傾眠があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には、減量、休薬又は投与中止等の適切な処置を行うこと。(「2. 重要な基本的注意」の項参照)
- 2) 幻覚、妄想、興奮、錯乱、譫妄：幻覚、妄想、興奮、錯乱、譫妄等の精神症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には、減量、休薬又は投与中止等の適切な処置を行うこと。
- 3) 悪性症候群：本剤の投与後、減量後又は中止後に、高熱、意識障害、高度の筋硬直、不随意運動、ショック症状等があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、投与開始初期の場合は中止し、また、継続投与中の用量変更・中止時の場合は一旦もとの投与量に戻した後慎重に漸減し、体冷却、水分補給等の適切な処置を行うこと。なお、投与継続中にも同様の症状があらわれることがある。

#### (2) その他の副作用

次のような症状があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症	発疹、痒疹、蕁麻疹、血管浮腫等
精神系	リビドー亢進、病的賭博、強迫性購買、暴食、攻撃性
神経系	傾眠、めまい、ジスキネジー、失神
血液障害	起立性低血圧、低血圧
胃腸障害	悪心、嘔吐、腹痛、消化不良、便秘
その他	末梢性浮腫、薬剤離脱症候群 <sup>①)</sup> (無感情、不安、うつ、疲労感、発汗、疼痛等)

注) 異常が認められた場合には、投与再開又は減量前の投与量に戻すなど、適切な処置を行うこと。

### 5. 高齢者への投与

ロピニロール塩酸塩製剤の臨床試験において高齢者に幻覚等の精神症状が多くみられたので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。[動物実験(ラット)で胎児毒性(体重減少、死亡数増加及び指の奇形)が報告されている。]

(2) 授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合は授乳を避けさせること。[ロピニロール塩酸塩製剤の臨床試験で本剤投与後に血漿中プロラクチン濃度の低下が認められたため、乳汁分泌が抑制されるおそれがある。また、動物実験(ラット)で乳汁中に移行することが報告されている。]

### 7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

### 8. 過量投与

徴候・症状：本剤の過量投与によりドパミン作用に関連する症状の発現が予想される。

処置：適宜、胃洗浄等を行い、必要に応じて、適切な対症療法を行うこと。ドパミン拮抗薬(抗精神病薬、メトクロプラミド等)投与により症状が軽減することがある。なお、血液透析による除去の効果については不明である。

### 9. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

### 10. その他の注意


動物実験(ラット)で1.5~50mg/kg/日の2年間投与により、精巣Leydig細胞の過形成、腺腫の発生頻度が用量依存的に増加したとの報告がある。なお、マウスではがん原性は認められていない。

### 【薬物動態】

#### 生物学的同等性試験

##### (1) ロピニロール錠0.25mg [JG]

ロピニロール錠0.25mg [JG]と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(ロピニロールとして0.25mg)健康成人男子に空腹時単回経口投与して血漿中ロピニロール濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。<sup>1)</sup>



	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-24</sub> (pg·hr/mL)	Cmax (pg/mL)	Tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
ロピニロール錠0.25mg [JG]	3508.2±1438.0	551.5±134.3	1.5±0.6	4.6±0.8
標準製剤 (錠剤、0.25mg)	3726.6±1465.8	546.2±149.5	1.7±0.5	4.7±1.0

(Mean±S.D., n=16)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

##### (2) ロピニロール錠1mg [JG]

ロピニロール錠1mg [JG]は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日：薬食審査発0229第10号)」に基づき、ロピニロール錠0.25mg [JG]を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。<sup>2)</sup>

##### (3) ロピニロール錠2mg [JG]

ロピニロール錠2mg [JG]は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日：薬食審査発0229第10号)」に基づき、ロピニロール錠0.25mg [JG]を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。<sup>3)</sup>

**【有効成分に関する理化学的知見】**

一般名：ロピニロール塩酸塩 (Ropinirole Hydrochloride)


化学名：4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-2-indolinone  
monohydrochloride

分子式：C<sub>16</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O · HCl

分子量：296.84

融点：約244℃ (分解)

構造式：



性状：ロピニロール塩酸塩は白色～淡黄色の粉末である。  
水に溶けやすく、メタノール又は酢酸（100）にや  
や溶けやすく、エタノール（95）にやや溶けにく  
く、無水酢酸に極めて溶けにくい。

**【取扱い上の注意】****安定性試験**

最終包装製品を用いた長期保存試験（25℃、2年）の結果、ロ  
ピニロール錠0.25mg「JG」、ロピニロール錠1mg「JG」及び  
ロピニロール錠2mg「JG」は通常の市場流通下において2年  
間安定であることが確認された。<sup>4)</sup>

**【包装】**

ロピニロール錠0.25mg「JG」

PTP：105錠（21錠×5）

ロピニロール錠1mg「JG」

PTP：105錠（21錠×5）

ロピニロール錠2mg「JG」

PTP：105錠（21錠×5）

**【主要文献】**

- 1)長生堂製薬株式会社 社内資料（生物学的同等性試験に関す  
る資料）
- 2)長生堂製薬株式会社 社内資料（生物学的同等性試験に関す  
る資料）
- 3)長生堂製薬株式会社 社内資料（生物学的同等性試験に関す  
る資料）
- 4)長生堂製薬株式会社 社内資料（安定性試験に関する資料）

**【文献請求先】**

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

日本ジェネリック株式会社 お客さま相談室


〒100-6739 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

販売元

 **日本ジェネリック株式会社**  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

製造販売元

 **長生堂製薬株式会社**  
徳島市国府町府中92番地