

貯 法：室温保存  
使用期限：外箱及びラベルに表示(期限内に使用すること。)  
注 意：【取扱い上の注意】の項参照

定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤  
処方箋医薬品<sup>注)</sup>

モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」56噴霧用  
モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」112噴霧用

MOMETASONE Nasal 50 $\mu$ g “KYORIN” 56sprays/112sprays  
(モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物点鼻液)

	56噴霧用	112噴霧用
承認番号	22900AMX00694000	22900AMX00695000
薬価収載	2019年6月	
販売開始	2019年8月	

注)注意—医師等の処方箋により使用すること

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- 有効な抗菌剤の存在しない感染症、全身性の真菌症の患者[症状を増悪させるおそれがある。]
- 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

販売名	モメタゾン 点鼻液50 $\mu$ g「杏林」 56噴霧用	モメタゾン 点鼻液50 $\mu$ g「杏林」 112噴霧用
成分	モメタゾンフランカルボン酸 エステル水和物	
含量 (モメタゾンフラン カルボン酸エステル として)	1g中 0.5mg 1回噴霧中 50 $\mu$ g	
添加物	ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート 80、結晶セルロース・カルメロースナトリ ウム、グリセリン、pH調整剤	
剤形	定量噴霧式懸濁剤	
性状	白色の不透明な懸濁液	
1容器の噴霧回数	56回	112回

【効能・効果】

アレルギー性鼻炎

【用法・用量】

<成人>

通常、成人には、各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回投与する(モメタゾンフランカルボン酸エステルとして1日200 $\mu$ g)。

<小児>

通常、12歳未満の小児には、各鼻腔に1噴霧ずつ1日1回投与する(モメタゾンフランカルボン酸エステルとして1日100 $\mu$ g)。

通常、12歳以上の小児には、各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回投与する(モメタゾンフランカルボン酸エステルとして1日200 $\mu$ g)。

【使用上の注意】「\*」

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 結核性疾患、未治療の感染症及び眼の単純ヘルペス患者[症状を増悪させるおそれがある。]
- 反復性鼻出血の患者[出血を増悪させるおそれがある。]

2. 重要な基本的注意

- 鼻・咽喉頭真菌症が発現した場合、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが、点鼻ステロイド剤を特に長期間、大量に投与する場合に小児の成長遅延をきたすおそれがある。本剤を小児に長期間投与する場合には、身長等の経過の観察を十分行うこと。また、使用にあたっては、使用法を正しく指導すること。

- ステロイド剤は創傷治癒を抑制する作用があるため、鼻中隔潰瘍のある患者、鼻の手術を受けた患者、あるいは鼻外傷のある患者には、患部が治癒するまで本剤を投与しないこと。
- ステロイド剤の全身投与から局所投与に切り替えた際に、副腎皮質機能不全又は離脱症状(関節あるいは筋肉の疼痛、倦怠感及びうつ等)が発現することがあるので、これらの徴候、症状があらわれた場合には、適切な処置を行うこと。また、全身性ステロイド剤の減量中並びに離脱後も副腎皮質機能検査を行い、外傷、手術、重症感染症等の侵襲には十分に注意を払うこと。
- 全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが、点鼻ステロイド剤の投与により全身性の作用(クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能抑制、小児の成長遅延、骨密度の低下、白内障、緑内障を含む)が発現する可能性がある。特に長期間、大量投与の場合には定期的に検査を行い、全身性の作用が認められた場合には適切な処置を行うこと。
- 通年性アレルギー性鼻炎の患者において長期に使用する場合、症状の改善状態が持続するようであれば、本剤の減量につとめること。
- 本剤の投与が数ヶ月以上にわたる場合は、鼻中隔潰瘍等の鼻所見に注意すること。
- 季節性の疾患に対しては、好発期を考慮して、その直前から治療を開始し、抗原との接触がなくなるまで続けることが望ましい。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。(再審査対象外)

\* (1) 重大な副作用(頻度不明)

アナフィラキシー：アナフィラキシー(呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等)があらわれたことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

次のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

分類	副作用(頻度不明)
過敏症	蕁麻疹等の発疹
鼻腔	鼻症状(刺激感、そう痒感、乾燥感、疼痛、発赤、不快感等)、真菌検査陽性、鼻出血、鼻漏、鼻閉、くしゃみ、嗅覚障害、鼻中隔穿孔、鼻潰瘍、鼻症状(灼熱感)
口腔並びに呼吸器	咽喉頭症状(刺激感、疼痛、不快感、乾燥等)、咳嗽、上気道炎
肝臓	肝機能障害、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、ビリルビン上昇、Al-P上昇、ウロビリリン尿
血液	好中球増多、好酸球増多、単球増多、白血球減少、白血球増多、白血球分画異常、赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、リンパ球減少、血小板減少、カリウム上昇
精神神経系	頭痛、倦怠感
* 眼	眼圧亢進、霧視、中心性漿液性網脈絡膜症
その他	コルチゾール減少、蛋白尿、尿糖、BUN上昇、コルチゾール上昇、味覚障害

#### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

#### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔経皮又は経口投与による動物実験(ラット、ウサギ)で催奇形性作用が報告されている。〕

#### 6. 小児等への投与

3歳未満の幼児、乳児、新生児又は低出生体重児に対する安全性は確立していない。〔国内における使用経験がない。〕

#### 7. 適用上の注意

**投与経路：**鼻腔内噴霧用にのみ使用すること。

#### 【薬物動態】

##### 血漿中濃度

健康成人男性にモメタゾンフランカルボン酸エステル点鼻液200 $\mu$ g(6例)又は400 $\mu$ g(6例)を1日2回<sup>注1)</sup>7日間反復鼻腔内投与した際、血漿中モメタゾンフランカルボン酸エステル濃度は200 $\mu$ g1日2回投与群の1例において初回投与後30分に定量下限をわずかに上回る値(57.2pg/mL)が認められたが、他の被験者は全測定時点で定量下限未満(<50pg/mL)であった。

注1)本剤の成人の承認用法・用量は、「通常、成人には、各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回投与する(モメタゾンフランカルボン酸エステルとして1日200 $\mu$ g)。」である。

#### 【薬効薬理】

##### <作用機序>


モメタゾンフランカルボン酸エステルはヒトのヘルパーT(Th)細胞からのインターロイキン-4(IL-4)及びIL-5産生(Th2細胞の活性化)を抑制した(in vitro)<sup>1)</sup>。鼻腔内投与により能動感作マウスのIgE及びIgG1抗体産生を抑制した(in vivo)<sup>2)</sup>。さらに、ラット好酸球の走化性因子による遊走能を低下させた(in vitro)<sup>3)</sup>。これらの機序によりモメタゾンフランカルボン酸エステルは各種アレルギー性鼻炎モデルにおいて鼻症状抑制作用を示すと考えられる。

#### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 (Mometasone Furoate Hydrate)

化学名：(+)-9,21-Dichloro-11 $\beta$ ,17 $\alpha$ -dihydroxy-16 $\alpha$ -methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-(2-furoate) monohydrate

構造式：



分子式：C<sub>27</sub>H<sub>30</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>6</sub> · H<sub>2</sub>O

分子量：539.44

性状：モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物は白色の粉末である。本品はN,N-ジメチルアセトアミドに溶けやすく、ジオキサンにやや溶けやすく、メタノール、エタノール(99.5)又はアセトニトリルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。

融点：約220 $^{\circ}$ C(分解)

#### 【取扱い上の注意】

1. 患者には添付の携帯袋及び使用説明書を渡し、使用方法を指導すること。
2. 本剤の使用前に容器を上下によく振ること。
3. 本剤の初回使用時のみ空打ちを行い(10回程度)、液が完全に霧状になることを確認し使用すること。
4. 噴霧口を針やピンなどで突かないこと。
5. 安定性試験  
最終包装製品を用いた長期保存試験(25 $^{\circ}$ C、相対湿度40%、3年)の結果により、モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」56噴霧用・112噴霧用は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認されている。

#### 【包装】

モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」56噴霧用  
10g $\times$ 5

モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」112噴霧用  
18g $\times$ 5

#### 【主要文献】

- 1)Umland SP,et al.:J Allergy Clin Immunol, 100(4), 511, 1997
- 2)Magari M,et al.:Immunopharmacol immunotoxicol, 28(3), 491, 2006
- 3)Sugimoto Y,et al.:Int Immunopharmacol, 3(6), 845, 2003

#### 【文献請求先】

杏林製薬株式会社 くすり情報センター  
〒101-8311 東京都千代田区神田駿河台4-6  
電話 0120-409341  
受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

販売元

杏林製薬株式会社

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

製造販売元

キョーリンリメディオ株式会社

富山県南砺市井波885番地