

トロンボキサン合成酵素阻害剤

処方箋医薬品^{※1)}

※※ 日本薬局方
 オザグレルナトリウム注射液
オサグレン[®]点滴静注20mg
オサグレン[®]点滴静注40mg
オサグレン[®]点滴静注80mg

OSAGREN[®] INTRAVENOUS INFUSION 20mg/
 INTRAVENOUS INFUSION 40mg/INTRAVENOUS INFUSION 80mg

貯 法：室温保存
 使用期限：外箱、アンプルに記載

日本標準商品分類番号 87399			
	承認番号	薬価収載	販売開始
点滴静注20mg	21700AMZ00024	2005年7月	2005年7月
点滴静注40mg	21700AMZ00025	2005年7月	2005年7月
点滴静注80mg	21700AMZ00026	2005年7月	2005年7月

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- 1) 出血している患者：出血性脳梗塞、硬膜外出血、脳内出血又は原発性脳室内出血を合併している患者〔出血を助長する可能性がある。〕
- 2) 脳塞栓症の患者〔脳塞栓症の患者は出血性脳梗塞が発現しやすい。〕
- 3) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】

- 1) 脳塞栓症のおそれのある患者：心房細動、心筋梗塞、心臓弁膜疾患、感染性心内膜炎及び瞬時完成型の神経症状を呈する患者〔脳塞栓症の患者は出血性脳梗塞が発現しやすい。〕
- 2) 重篤な意識障害を伴う大梗塞の患者〔大梗塞の患者は出血性脳梗塞が発現しやすい。〕

【組成・性状】

	オサグレン 点滴静注20mg	オサグレン 点滴静注40mg	オサグレン 点滴静注80mg
1管中の有効成分	1管(1mL)中 日局 オザグレル ナトリウム ……………20mg	1管(2mL)中 日局 オザグレル ナトリウム ……………40mg	1管(4mL)中 日局 オザグレル ナトリウム ……………80mg
添加物	pH調整剤（リン酸水素2Na） リン酸二水素Na）適量		
性状	無色澄明の液である。		
pH	7.7～8.7		
浸透圧比	0.2～0.3(本品1mLに注射用水1mLを加えた液)		

【効能・効果】

1. クモ膜下出血術後の脳血管攣縮及びこれに伴う脳虚血症状の改善
2. 脳血栓症（急性期）に伴う運動障害の改善

【用法・用量】

1. クモ膜下出血術後の脳血管攣縮及びこれに伴う脳虚血症状の改善
 通常成人に、オザグレルナトリウムとして1日量80mgを適量の電解質液又は糖液で希釈し、24時間かけて静脈内に持続投与する。投与はクモ膜下出血術後早期に開始し、2週間持続投与することが望ましい。なお、年齢、症状により適宜増減する。

2. 脳血栓症（急性期）に伴う運動障害の改善

通常成人に、オザグレルナトリウムとして1回量80mgを適量の電解質液又は糖液で希釈し、2時間かけて1日朝夕2回の持続静注を約2週間行う。なお、年齢、症状により適宜増減する。

※【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 1) 出血している患者：消化管出血、皮下出血等〔出血を助長する可能性がある。〕
- 2) 出血の可能性のある患者：脳出血の既往歴のある患者、重症高血圧患者、重症糖尿病患者、血小板の減少している患者等〔出血を助長する可能性がある。〕
- 3) 抗血小板剤、血栓溶解剤、抗凝血剤を投与中の患者（「相互作用」の項参照）

2. 重要な基本的注意

本剤の投与により出血性脳梗塞、硬膜外出血、脳内出血を助長する可能性があるため、救急処置のとれる準備を行い投与すること。また、臨床症状及びコンピューター断層撮影による観察を十分に行い、出血が認められた場合には直ちに投与を中止し適切な処置を行うこと。

3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗血小板剤 チクロピジン アスピリン 等 血栓溶解剤 ウロキナーゼ アルテプラザー 等 抗凝血剤 ヘパリン ワルファリン アルガトロバン 等	これらの薬剤と併用することにより出血傾向の増強をきたすおそれがある。 観察を十分に行い、減量するなど用量を調節すること。	本剤は血小板凝集能を抑制するため、類似的作用を持つ薬剤を併用することにより作用を増強する可能性がある。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

1) 重大な副作用（頻度不明）

- (1) 出血：出血性脳梗塞・硬膜外血腫・脳内出血、消化管出血、皮下出血、血尿等があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。〔血小板凝集能を抑制するため〕

注1) 注意－医師等の処方箋により使用すること

- ※(2) ショック、アナフィラキシー：ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、血圧低下、呼吸困難、喉頭浮腫、冷感等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- (3) 肝機能障害、黄疸：著しいAST(GOT)・ALT(GPT)の上昇等を伴う重症な肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。
- (4) 血小板減少：血小板減少があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には減量又は投与を中止すること。
- (5) 白血球減少、顆粒球減少：白血球減少、顆粒球減少があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。発症時には発熱や悪寒等がみられることが多いので、これらの症状があらわれた時は本症を疑い血液検査を行うこと。
- (6) 腎機能障害：重篤な腎機能障害（急性腎不全等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。なお、腎機能障害時には血小板減少を伴うことが多い。

2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注2)}	発疹、蕁麻疹、紅斑、喘息(様)発作、そう痒等
循環器 ^{注3)}	上室性期外収縮、血圧下降
血液	貧血
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、LDH上昇、Al-P上昇、ビリルビン上昇等
腎臓	BUN上昇、クレアチニン上昇
消化器	嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振、膨満感
その他	発熱、頭痛、胸内苦悶感、注射部の発赤・腫脹・疼痛、ほてり、悪寒・戦慄、関節炎、CRP上昇、CK(CPK)上昇

注2) 発現した場合には投与を中止すること。

注3) 発現した場合には減量又は投与を中止すること。

5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので慎重に投与すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。
[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。

8. 適用上の注意


調製時：カルシウムを含む輸液で希釈すると白濁することがあるので、カルシウムを含む輸液（リンゲル液等）を希釈に用いるときは、本剤80mgあたり300mL以上の輸液で使用する。

【薬効薬理】

アラキドン酸カスケード中のトロンボキサン₂ (TXA₂) 合成酵素を選択的に阻害してトロンボキサンTXA₂の産生を抑制し、TXA₂による血小板凝集能を抑制すると共に、プロスタサイクリンの産生を促進して、両者のバランス異常を改善する¹⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

構造式：



一般名：オザグレルナトリウム (Ozagrel Sodium)

化学名：Monosodium (2E)-3-[4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl] prop-2-enoate

分子式：C₁₃H₁₁N₂NaO₂

分子量：250.23

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。水に溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、エタノール (99.5) にはほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

1. 注意

本品はイーザーカットアンプルに遮光フィルムを被覆したもので、どの方向からでもアンプルカットができます。

1) アンプル胴部を図のように持ちます。



2) 次に、もう一方の手で枝部をつまみ、図のように折ります。



2. 安定性試験

最終包装製品を用いた長期保存試験（室温、3年）の結果、オサグレン点滴静注20mg、オサグレン点滴静注40mg及びオサグレン点滴静注80mgは通常の市場流通下においてそれぞれ3年間安定であることが確認された²⁾³⁾⁴⁾。

【包装】

オサグレン点滴静注20mg：1 mL×10管

オサグレン点滴静注40mg：2 mL×10管、2 mL×50管

オサグレン点滴静注80mg：4 mL×10管

【主要文献】

- 1) 第十七改正日本薬局方解説書、C-1162、2016
- 2) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験（点滴静注20mg）
- 3) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験（点滴静注40mg）
- 4) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験（点滴静注80mg）

【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献（社内資料を含む）は下記にご請求下さい。

東和薬品株式会社 学術部DIセンター（24時間受付対応）

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号

☎0120-108-932 TEL 06-6900-9108 FAX 06-6908-5797

http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff

製造販売元



東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号