


NIKKO

外皮用殺菌消毒剤

消毒用エタノール 「ニッコー」

ETHANOL FOR DISINFECTION 「NIKKO」

日本薬局方 消毒用エタノール 500mL

製造販売元
 日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

※2017年2月 改訂(第3版) 2015年1月 改訂	
日本標準商品分類番号	872615
承認番号	16100AMZ01296
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年1月
再評価結果	1982年8月

貯法：気密容器に入れ、避光して保存
使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）
注意：取扱い上の注意の項参照

【禁忌】（次の部位には使用しないこと）
損傷皮膚及び粘膜【刺激作用を有するので】

※【組成・性状】

- 組成
本品は15℃でエタノール（ C_2H_6O ・46.07）76.9～81.4vol%を含む。
- 性状
本品は無色透明の液である。本品は水と混和する。
本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。
本品は揮発性である。比重 d_4^{20} ：0.86027～0.87264

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
(1)本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は、直ちによく水洗すること。
(2)広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^注	発疹等
皮膚 ^注	刺激症状

注）このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

投与経路・外用にのみ使用すること。

使用時：

- 同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 本剤は血清、胆汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

4. その他の注意

承認外の経皮的エタノール注入療法（PEIT）使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

【薬効薬理】

本剤は、使用濃度において、栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

- 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐蝕を防止するため0.2～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
- 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- 本剤は引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。又、電気メスによる発火事故が報告されているので、電気メス等を使用する場合には、本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。

火気厳禁

第4類
アルコール類
水溶性
危険等級II



キャップ:PP
容器:PE

製造番号

使用期限

