

※2012年6月改訂(第6版)

\*2009年6月改訂

貯 法 保存条件 遮光、室温保存  
容 器 気密容器  
使用期限 ラベルに記載  
注 意 「取扱い上の注意」の項参照

【組成・性状】

\*1. 組 成

100g中 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 10g(10w/w%)  
添加物 pH調整剤

2. 製剤の性状

本品は帯黄色の粘性な液で、わずかに特異なおいがある。

pH 7.0~9.0 (1→10)

【効能・効果】 【用法・用量】

アルキルジアミノエチルグリシンとして下記の濃度になるように水で希釈して、次のように使用する。

効能・効果	用法・用量
手指・皮膚の消毒	0.05~0.2%溶液で約5分間洗った後、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	0.1%溶液で5分間洗った後、0.2%溶液を塗布する。
手術部位(手術野)の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	0.01~0.05%溶液を用いる。
医療機器の消毒	0.05~0.2%溶液に10~15分間浸漬する。結核領域においては0.2~0.5%溶液を用いる。
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	0.05~0.2%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。結核領域においては0.2~0.5%溶液を用いる。

両性石ケン液10%「日医工」 希釈法

濃 度 (%)	0.01%	0.05%	0.1%	0.2%	0.5%
希 釈 倍 数	1000倍	200倍	100倍	50倍	20倍
両性石ケン液の量	1mL	5mL	10mL	20mL	50mL
全 量	1000mL				

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻 度 不 明
過 敏 症 <sup>注)</sup>	発疹、そう痒感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿たん白試験で偽陽性を示すことがある。

3. 適用上の注意

(1)人体

使用時

- 1)外用にのみ使用すること。
- 2)原液又は濃厚液が眼に入らないように注意すること。いった場合には水でよく洗い流すこと。

原液：うすめて使用してください


\*\*\*

# 外皮用殺菌消毒剤

## 両性石ケン液10%「日医工」

〈アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩製剤〉

500mL



製造販売元  
\*\*\* 日医工株式会社  
富山市総曲輪1丁目6番21



ボトル:PE  
キャップ:PP  
ラベル:PE

日本標準商品分類番号  
872619

承認番号 21500AMZ00150000  
\*\*薬価収載 2012年6月  
販売開始 2006年1月

216377F

- 3)散布消毒の場合はマスクを着用するなど注意すること。
  - 4)濃厚液の使用により、皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。
  - 5)炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、通常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
  - 6)粘膜、創傷面又は炎症部位に長時間又は広範囲に使用しないこと。
- 調製時  
深い創傷に使用する場合は希釈液としては、注射用水が滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

②その他

使用時

石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん成分を洗い落としてから使用すること。

③緊急処置

1)眼に入った場合

洗浄の際、眼球、瞼のすみすみまで水がよく行きわたるように、清浄な水で15分間以上洗浄した後、直ちに適切な処置を行うこと。

2)飲み込んだ場合

水でよく口を洗い、水又は牛乳を飲ませ(無理に吐き出させない)、直ちに適切な処置を行うこと。

【取扱い上の注意】

1. 次の医薬品が混入すると、沈殿が生じるので注意すること。  
ヨードチンキ、マーキュロクロム、硝酸銀、フェノール、過酸化水素、過マンガン酸カリウム等
2. 本剤は多少色調の濃淡に差があることがあり、また、寒冷時にわずかに混濁を生じることがあるが、殺菌作用に影響はない。混濁は加温することにより溶解する。
3. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合は、腐食を防止するため0.2%の割合で亜硝酸ナトリウムを溶解し浸漬すること(殺菌作用に影響はない)。なお、鋼製の器具は亜硝酸ナトリウムを添加しても腐食を防止できないので長時間浸漬しないこと。

【包 装】

500mL

【問い合わせ先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター  
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21  
☎(0120)517-215 Fax(076)442-8948

月 日 開 封  
月 日 期 限

＜調剤包装単位用＞



(01)04987376597975

＜販売包装単位用＞

GS1

(17)00000(10)000000



(01)14987376597910

製造番号

使用期限