

\*\*2012年6月改訂 (第5版)

\*2009年6月改訂

**貯 法**

保存条件 室温保存

容 器 気密容器

使用期限 ラベルに記載

日本標準商品分類番号

872649

承認番号 16100AMZ00082000

\*\*薬価収載 2012年6月

販売開始 2006年1月

再評価結果 1979年2月

鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

日本薬局方

**チ ン ク 油**

\*\*〈チンク油「日医工」〉

ZINC OXIDE OIL

**【禁 忌 (次の部位には使用しないこと)】**

重度又は広範囲の熱傷 [酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]

**【組成・性状】**

**\*\* 1. 組 成**

本品は定量するとき、酸化亜鉛 (ZnO:81.38) 45.0 ~ 55.0% を含む。

1000g中 日本薬局方 酸化亜鉛 500g

添加物 日本薬局方 ダイズ油

**2. 製剤の性状**

本品は白色～類白色の泥状物で、長く静置するとき、成分の一部を分離する。

**【効能・効果】**

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐

小範囲の擦傷, 小範囲の第一度熱傷, 小範囲の湿疹・皮膚炎

**【用法・用量】**

通常、症状に応じ1日1～数回、直接患部に塗布する。

**【使用上の注意】**

**1. 副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻 度 不 明
過 敏 症 <sup>注)</sup>	過敏症状
皮 膚 <sup>注)</sup>	発疹, 刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

**2. 適用上の注意**

眼には使用しないこと。

**【有効成分に関する理化学的知見】**

一般名：酸化亜鉛 (Zinc Oxide)

分子式：ZnO

\*\*分子量：81.38

**【包装】**

500g(ガラス)

**\*【問い合わせ先】**

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎(0120)517-215 Fax (076)442-8948