

日本薬局方 アロプリノール錠

アロプリノール錠 50mg「ケミファ」

アロプリノール錠 100mg「ケミファ」

Allopurinol

処方箋医薬品^注

貯法：密閉容器（室温保存）

※ 使用期限：外装に表示（3年）

注）注意—医師等の処方箋により使用すること。

	50mg	100mg
承認番号	22200AMX00831000	22300AMX00460000
薬価収載	2010年11月	2011年11月
販売開始	2010年11月	1978年2月

●禁忌（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

●組成・性状

1. 組成

アロプリノール錠 50mg「ケミファ」は、1錠中に（日局）アロプリノールを 50.0mg 含有する。

添加物として、乳糖水和物、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

アロプリノール錠 100mg「ケミファ」は、1錠中に（日局）アロプリノール 100.0mg を含有する。

添加物として、乳糖水和物、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

2. 製剤の性状

アロプリノール錠 50mg「ケミファ」は白色～微黄白色の素錠であり、アロプリノール錠 100mg「ケミファ」は、白色の割線入り素錠である。

	サイズ	表	裏	側面	識別コード
アロプリノール錠 50mg「ケミファ」	直径 6.5mm				NC A 50
	厚さ 2.2mm				
	重量 100mg				
アロプリノール錠 100mg「ケミファ」	直径 8.0mm				NCP 394A
	厚さ 2.6mm				
	重量 180mg				

●効能又は効果

下記の場合における高尿酸血症の是正
 痛風、高尿酸血症を伴う高血圧症

●用法及び用量

通常、成人は 1 日量アロプリノールとして 200～300mg を 2～3 回に分けて食後に経口投与する。年齢、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 肝疾患を有するか、又はその既往歴のある患者
 [肝障害が発現又は増悪するおそれがあるので、投与する場合は定期的に肝機能検査を実施すること。]
- 腎機能障害のある患者
 [高い血中濃度が持続するので、減量等を考慮すること（「2. 重要な基本的注意」の項参照）。]
- 高齢者（「5. 高齢者への投与」の項参照）
- メルカプトプリン（6-MP）又はアザチオプリンを投与中の患者（「3. 相互作用」の項参照）
- ペントスタチンを投与中の患者（「3. 相互作用」の項参照）

2. 重要な基本的注意

- 本剤の投与により**皮膚症状又は過敏症状**が発現し、重篤な症状に至ることがあるので、**発熱、発疹等**が認められた場合には**直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと**（「4. 副作用（1）重大な副作用」の項参照）。
- 腎機能障害のある患者**では本剤やその代謝物の排泄が遅延し高い血中濃度が持続するので、投与量の減量や投与間隔の延長を考慮すること。特に**腎不全患者に副作用が発現した場合は重篤な転帰をたどることがあり、死亡例も報告されている**ので、患者の状態を十分に観察し注意しながら投与すること（「1. 慎重投与」の項参照）。
- 急性痛風発作**がおさまるまで、本剤の投与を開始しないこと。
- 投与初期**に尿酸の移動により、**痛風発作**の一時的な増強をみることがある。
 [血中尿酸値を測定しながら投与し、治療初期 1 週間は 1 日 100mg 投与が望ましい。]
- 本剤投与中に痛風が増悪した場合にはコルヒチン、インドメタシン等を併用すること。

3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

- 次の医薬品の代謝又は排泄を阻害するとの報告がある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
メルカプトプリン（6-MP） アザチオプリン	骨髄抑制等の副作用を増強する。 これらの薬剤の用量を 1/3～1/4 に減量すること。	本剤がアザチオプリンの代謝酵素であるキサンチンオキシダーゼを阻害する。その結果 6-メルカプトプリンの血中濃度が上昇する。
ビダラビン	ビダラビンの作用を増強し、幻覚、振戦、神経障害等が発現したとの報告がある。 副作用の発現に注意すること。	本剤がビダラビンの代謝を抑制し、ビダラビンの作用を増強すると報告されている。
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン カリウム	クマリン系抗凝血剤の作用を増強するとの報告がある。 凝固能の変動に注意し、クマリン系抗凝血剤の投与量の減量あるいは投与間隔の延長を考慮すること。	本剤による肝代謝酵素活性の低下作用により、クマリン系抗凝血剤の代謝を阻害するためクマリン系抗凝血剤の半減期が延長すると報告されている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
クロルプロパミド	クロルプロパミドの作用を増強する。血糖値の変動に注意し、クロルプロパミドの投与量の減量あるいは投与間隔の延長を考慮すること。	尿細管分泌の競合によりクロルプロパミドの半減期が延長すると報告されている。
シクロホスファミド	骨髄抑制が発現したとの報告がある。定期的に血液検査を行い、白血球減少等の副作用の発現に注意すること。	本剤又は本剤の代謝物がシクロホスファミドの肝代謝を阻害する、又は、シクロホスファミド腎排泄を競合阻害すると報告されている。
シクロスポリン	シクロスポリンの血中濃度が上昇し、腎機能低下が発現したとの報告がある。シクロスポリンの投与量に注意すること。	本剤がシクロスポリンの肝代謝を阻害するためシクロスポリンの血中濃度が上昇すると報告されている。
フェニトイン	フェニトインの血中濃度が上昇し、嗜眠が発現したとの報告がある。フェニトインの投与量に注意すること。	本剤がフェニトインの肝代謝を阻害するためフェニトインの血中濃度が上昇すると報告されている。
キサンチン系薬剤 テオフィリン等	キサンチン系薬剤(テオフィリン等)の血中濃度が上昇する。キサンチン系薬剤の投与量に注意すること。	本剤がテオフィリンの代謝酵素であるキサンチンオキシダーゼを阻害するためテオフィリンの血中濃度が上昇すると報告されている。
ジダノシン	健康成人及びHIV患者において、ジダノシンのCmax及びAUCが2倍に上昇したとの報告がある。ジダノシンの投与量に注意すること。なお、ジダノシンの半減期には影響はみられていない。	本剤がジダノシンの代謝酵素であるキサンチンオキシダーゼを阻害するため、ジダノシンの血中濃度が上昇すると考えられる。

(2) 次の医薬品との併用により過敏反応を発現するとの報告がある。患者の状態を注意深く観察し、発熱を伴う皮疹等の過敏症状が発現した場合には直ちに両剤の投与を中止すること。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ベントスタチン	重症の過敏反応(過敏性血管炎)が発現したとの報告がある。	機序は不明である。
カプトプリル	過敏症状(Stevens-Johnson症候群、関節痛等)が発現したとの報告がある。	機序は不明である。特に腎障害のある患者では注意すること。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ヒドロクロロチアジド	重症の過敏反応(悪寒、全身性の皮疹等)が発現したとの報告がある。	機序は不明である。
アンピシリン	発疹の発現が増加するとの報告がある。	機序は不明であるが、本剤又は高尿酸血症によりアンピシリンの過敏反応が増強される可能性が報告されている。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

- 1) **中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、剥脱性皮膚炎等の重篤な皮膚障害又は過敏性血管炎**があらわれることがある。特に肝障害又は腎機能異常を伴うときは、重篤な転帰をたどることがある。従って、発熱、発疹等が認められた場合には、直ちに投与を中止し、再投与しないこと。また、ステロイド剤の投与等適切な処置を行うこと。
- 2) **薬剤性過敏症症候群¹⁾**：初期症状として発疹、発熱がみられ、更にリンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現、肝機能障害等の臓器障害を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。また、1型糖尿病(劇症1型糖尿病を含む)を発症し、ケトアシドーシスに至った例も報告されている。観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化したり、脳炎等の中枢神経症状があらわれたりすることがあるので注意すること。
- 3) **ショック、アナフィラキシー**があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 4) **再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少**があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 5) **劇症肝炎等の重篤な肝機能障害、黄疸**があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 6) **腎不全、腎不全の増悪、間質性腎炎を含む腎障害**があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 7) **間質性肺炎**があらわれることがあるので、発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状があらわれた場合には、速やかに胸部X線等の検査を実施し、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 8) **横紋筋融解症**があらわれることがあるので、筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等の症状があらわれた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。

※※9) **無菌性髄膜炎**：頂部硬直、発熱、頭痛、悪心・嘔吐又は意識障害等の症状を伴う無菌性髄膜炎があらわれることがある。なお、本剤投与後数時間で発症した例も報告されている。

(2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^注	発疹、そう痒、関節痛
血液 ^注	貧血、白血球減少、紫斑、好酸球増多、リンパ節症
腎臓 ^注	腎機能異常
消化器	食欲不振、胃部不快感、軟便、下痢、口内炎
全身症状	全身倦怠感、浮腫、脱力感
その他	脱毛、CK (C P K) 上昇、味覚障害、女性化乳房、末梢神経障害

注) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。

5. 高齢者への投与

本剤の主代謝物は主として腎から排泄されるが、高齢者では腎機能が低下していることが多いため、高い血中濃度が持続するおそれがあるので、用量に留意して慎重に投与すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

[動物実験 (マウス) において妊娠 10 日目又は 13 日目に 50 及び 100mg/kg を腹腔内投与したところ、胎児に催奇形作用が認められたと報告されている。]

(2) 授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合には授乳を避けさせること。

[ヒト母乳中へ本剤及びその代謝物が移行することが報告されている。]

7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。

8. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。

[PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]

9. その他の注意

(1) 使用中は摂水量を多くし、1 日の尿量を 2L 以上とすることが望ましい。

(2) 外国における疫学調査報告で、アロプリノール製剤の投与により白内障があらわれたとの報告がある。

(3) 動物実験において、鉄剤と併用した場合に、アロプリノール製剤の大量投与により、肝の鉄貯蔵量が増加したとの報告がある。

(4) 漢民族 (Han-Chinese) を対象としたレトロスペクティブな研究において、アロプリノールによる中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN) 及び皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群) 等の重症薬疹発症例の HLA 型を解析した結果、51 例中全ての症例が HLA-B*5801 保有者であったとの報告がある。また、別の研究では、アロプリノールにより中毒性表皮壊死融解症及び皮膚粘膜眼症候群を発症した日本人及びヨーロッパ人において、それぞれ 10 例中 4 例 (40%)、27 例中 15 例 (55%) が HLA-B*5801 保有者であったとの報告もある。なお、HLA-B*5801 の保有率は漢民族では 20-30% に対し、日本人及びヨーロッパ人では 1-2% である。


●薬物動態

1. 生物学的同等性試験²⁾

アロプリノール錠 50mg 「ケミファ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (アロプリノールとして 50mg) 健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について 90% 信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80) ~ log(1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₈ (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
アロプリノール錠 50mg 「ケミファ」	306.50 ± 71.33	185.12 ± 82.25	1.14 ± 0.36	1.08 ± 0.25
標準製剤 (錠剤, 50mg)	294.34 ± 91.00	187.02 ± 80.61	1.32 ± 0.46	0.93 ± 0.17

(Mean ± S.D., n=14)



血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2. 溶出挙動³⁾

アロプリノール錠 50mg 「ケミファ」及びアロプリノール錠 100mg 「ケミファ」は、それぞれ日本薬局方医薬品各条に定められたアロプリノール錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

●薬効薬理⁴⁾

アロプリノールは高尿酸血症治療薬である。尿酸は、ヒポキサンチンやキサンチンからキサンチンオキシダーゼの働きで生成するが、アロプリノールはこの酵素を競合的に阻害することによって尿酸の産生を抑制する。アロプリノール自体もキサンチンオキシダーゼの作用でアロキサンチンに代謝されるが、アロキサンチンにも非競合的キサンチンオキシダーゼ阻害作用がある。

●有効成分に関する理化学的知見


一般名：アロプリノール (Allopurinol)

化学名：1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol

分子式：C₅H₄N₄O

分子量：136.11

構造式：



性状：アロプリノールは白色～微黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。

本品は *N, N*-ジメチルホルムアミドに溶けにくく、水又はエタノール（99.5）に極めて溶けにくい。本品はアンモニア試液に溶ける。

●取扱い上の注意

安定性試験⁵⁾

アロプリノール錠 50mg「ケミファ」：PTP 包装を用いた加速試験（40℃、相対湿度 75%、6 ヶ月）の結果、アロプリノール錠 50mg「ケミファ」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。

※アロプリノール錠 100mg「ケミファ」：最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度 75%、6 ヶ月）の結果、アロプリノール錠 100mg「ケミファ」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。

●包装

アロプリノール錠 50mg「ケミファ」：100 錠（10 錠×10）

アロプリノール錠 100mg「ケミファ」：100 錠（10 錠×10）

500 錠（10 錠×50）

1,000 錠（10 錠×100）

●主要文献

- 1) 厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性過敏症症候群
- 2) 日本ケミファ株式会社：生物学的同等性に関する資料（社内資料）
- 3) 日本ケミファ株式会社：溶出に関する資料（社内資料）
- 4) 第十七改正日本薬局方解説書 C-416, 廣川書店, 東京, 2016
- 5) 日本ケミファ株式会社：安定性に関する資料（社内資料）

●文献請求先

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

日本ケミファ株式会社 安全管理部

〒 101-0032 東京都千代田区岩本町 2 丁目 2 番 3 号

TEL 0120-47-9321 03-3863-1225

FAX 03-3861-9567

 製造販売元
日本ケミファ株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3