



500g

収斂・消炎・保護剤

日本薬局方 亜鉛華軟膏

Zinc Oxide Ointment



製造販売元

日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

| | |
|----------------|------------------|
| 2010年1月作成(第1版) | |
| 日本標準商品分類番号 | 872649 |
| 承認番号 | 16000AMZ01686000 |
| 薬価収載 | 2008年9月 |
| 販売開始 | 2010年1月 |
| 再評価結果 | 1979年2月 |

貯 法：気密容器、室温保存
使用期限：ラベルに表示

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

重度又は広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある]

【組成・性状】

| | |
|------------------|---|
| 販売名 | 亜鉛華軟膏「JG」 |
| 成分・含量 (100g中) | 酸化亜鉛 20g |
| 添加物 | 流動パラフィン、サラシミツロウ、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリン、ジブチルヒドロキシルエン |
| 性状 | 白色である。 |

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門瘻痒症、白癬、
面皰、癬、よう
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

000408500-002

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
以下のような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

| | |
|-----|---------|
| | 頻度不明 |
| 過敏症 | 過敏症状 |
| 皮膚 | 発疹・刺激感等 |

2.適用上の注意

眼には使用しないこと。



瓶：PE
キャップ：PP
外装フィルム：PVC

GS1 [販売単位]



(01)14987792212251

GS1 [調剤単位]



(01)04987792912987

製造番号

使用期限