



※※2019年8月改訂（第10版）
※2014年4月改訂

日本標準商品分類番号
877131

貯 法：室温保存
使用期限：容器、外箱に表示の使用
期限内に使用すること
注 意：「取扱い上の注意」の項参照
処方箋医薬品
(注意 - 医師等の処方箋)
により使用すること

日本薬局方

	20mL	100mL	100mL(ダブル)
許可番号	27A1X00039		
薬価収載	1994年7月	1987年10月	1987年10月
販売開始	1994年7月	1987年10月	1994年4月
		500mL(ダブル)	1000mL(ダブル)
許可番号	27A1X00039		
薬価収載	1976年4月	1984年6月	
販売開始	1994年1月	1994年4月	

注射用水 (注射用蒸留水)

Water for Injection

注射用水PL「フソー」

【組成・性状】

1. 組成

注射用水PL「フソー」は1ポリアル（プラスチックアンブル又はプラスチックボトル）中注射用水（注射用蒸留水）20mL、100mL、500mL又は1000mLを含む無色澄明の注射液である。

2. 製剤の性状

注射用水PL「フソー」はポリアル（ポリエチレン製容器）入りの無色澄明、無味無臭の注射液である。

※※【包 装】

20mL	10管	ポリアル（スノープル）
20mL	50管	ポリアル（スノープル）
100mL	10本	ポリアル（スタンダブル）
100mL	20本	ポリアル（開栓用ダブル）
500mL	20本	ポリアル（開栓用ダブル）
1000mL	10本	ポリアル（開栓用ダブル）

【効能・効果】

注射用医薬品の溶解・希釈剤

【用法・用量】

注射用医薬品の溶解・希釈に適量を用いる。

【使用上の注意】

適用上の注意

- 調製時：注射剤の溶解希釈剤として使用する場合は、注射用水が適切であることを確認すること。
- 投与前：
 - 投与に際しては、感染に対する配慮をすること（患者の皮膚や器具消毒）。
 - 開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。
- 投与时：溶解希釈した注射剤の用法・用量及び使用上の注意に留意して投与すること。

【取扱い上の注意】

100mLのスタンダブル製品：

- 通気針は不要（混注量等により、通気針が必要な場合もある）
- 連結管による連続投与は行わないこと。連続投与を行う場合には、Y型タイプのセットを使用すること
- 内容液の漏出又は混濁などが認められた場合は使用しないこと
- オーバーシール（ゴム栓部の汚染防止のためのシール）が万一はがれているときは使用しないこと
- ゴム栓への針刺は、ゴム栓面に垂直に、ゆっくりと行うこと。斜めに刺すと、ゴム片（コア）が薬液中に混入したり、ポート部を傷つけて液漏れを起こすおそれがある
- 容器の目盛はおよその目安として使用すること

ポリアル（スノープル）： ポリエチレン製アンブル
 ポリアル（スタンダブル）：輸液用のポリエチレン製ボトル
 ポリアル（開栓用ダブル）：広口と細口の開栓口を有するポリエチレン製ボトル

【主要文献及び文献請求先】

【文献請求先】 扶桑薬品工業株式会社 研究開発センター 学術部門
 〒536-8523 大阪市城東区森之宮二丁目3番30号
 TEL 06-6964-2763 FAX 06-6964-2706
 (9:00~17:30/土日祝日を除く)

製造販売元



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

DK-113-113A