

500g

消化酵素剤

パンクレアチン原末 「マルイシ」

Pancreatin「Maruishi」

日本薬局方

パンクレアチン

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

パンクレアチン原末 「マルイシ」

製造番号

使用期限

 < 調剤包装単位用コード >

 (01)04987211246525

 < 販売包装単位用コード >

 (01)14987211146525


500g

消化酵素剤

パンクレアチン原末 「マルイシ」

Pancreatin「Maruishi」

日本薬局方

パンクレアチン

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2



開封口

500g パンクレアチン原末「マルイシ」

2014年12月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872331
承認番号	22000AMX02240
薬価収載	2008年12月
販売開始	2008年12月
再評価結果	1983年4月

貯法：(1)吸湿注意 (2)30℃以下で保存すること。
 使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

- 禁忌(次の患者には投与しないこと)
 - (1)本剤に対し過敏症の既往歴のある患者
 - (2)ウシ又はブタたん白質に対し過敏症の既往歴のある患者

●組成・性状

- 組成
本品1g中 日局パンクレアチン1g 含有。
- 性状
白色～淡黄色の粉末で、特異なおいがある。

●効能・効果

消化異常症状の改善

●用法・用量

通常成人1回1gを1日3回食後に経口投与する。
 なお、年齢、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

- 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
過敏症(頻度不明)：くしゃみ、流涙、皮膚発赤等の過敏症状を起こすことがあるので、このような場合には投与を中止すること。

2. 使用上の注意

使用時：
 (1)投与に際しては、直ちに飲み下すように注意すること。[小児が誤って本剤を大量に停滞させたため、口内炎及び口腔内潰瘍を起こしたとの報告がある。]
 (2)投与に際しては、粉末を吸入しないように注意すること。[本剤の吸入により気管支痙攣、鼻炎を起こしたとの報告がある。]