

開封日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 500mL

外用殺菌消毒剤

希ヨードチンキ「マルイシ」

Dilute Iodine Tincture 「Maruishi」

日本薬局方

希ヨードチンキ

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

希ヨードチンキ「マルイシ」

500mL

2018年12月改訂(第3版)	
2014年9月改訂	
日本標準商品分類番号	872612
承認番号	16100AMZ01027
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1983年4月

貯 法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

注 意：〈配合変化〉マーキュロクロム液とは沈殿を生じる。

●禁忌(次の患者には使用しないこと)
 ヨード過敏症の患者

●組成・性状

1. 組成

100mL中 ヨウ素 3g
 及び添加物としてヨウ化カリウム、エタノール 含有。

2. 性状

暗赤褐色の液で、特異なにおいがある。
 比重 d_{20}^{20} ：約0.93

●効能・効果

皮膚表面の一般消毒、創傷・潰瘍の殺菌・消毒、歯肉及び
 口腔粘膜の消毒、根管の消毒

●用法・用量

本剤をそのまま、又は2～5倍に希釈し、1日2～3回患部及
 び皮膚に適量塗布する。

●使用上の注意

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる
 調査を実施していない。

	頻度不明	0.1%未満
過敏症 ^{注)}		ヨード疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状	

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 臨床検査結果に及ぼす影響

血漿たん白結合ヨード(PBI)及び甲状腺放射性ヨード
 摂取率の検査値に影響を及ぼすことがある。

3. 適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用し、内服しないこと。

使用時：

- (1)眼に入らないよう注意すること。入った場合には水
 でよく洗い流すこと。
- (2)粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使
 用しないこと。
- (3)深い創傷に使用する場合は希釈液としては注射用
 蒸留水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用い
 ないこと。
- (4)同一部位に反復使用した場合には、表皮の剥離を
 伴う急性の皮膚炎を起こすことがあるので注意す
 ること。
- (5)口腔内に使用するときは、患部を乾燥させて塗布
 すること。
- (6)本剤は引火性、爆発性があるため、火気には十分
 注意すること。



キャップ：PP

ガラス：瓶

A-1

製造番号

使用期限

△ドローコ用単位用包装剤

△ドローコ用単位用包装剤



(01)04987211222130