



Mylan

開封口

外用局所収れん剤  
日本薬局方 酸化亜鉛

酸化亜鉛「ファイザー」原末

1g/g

500g



外用局所収れん剤  
日本薬局方 酸化亜鉛  
酸化亜鉛「ファイザー」原末

1g/g

【使用上の注意】

1. 副作用  
本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状	
皮膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感等	

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意  
使用部位  
1) 誤って吸入させないよう注意させること。  
2) 眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

局所の収れん、分泌物の減少、痂皮の軟化、上皮の形成などの作用を有する。

【製品に関するお問い合わせ先】

ファイザー株式会社 製品情報センター  
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7  
学術情報ダイヤル 0120-664-467  
FAX 03-3379-3053



箱



袋:PE



読みやすさを追求した  
書体を使用しています

製造販売元  
マイラン製薬株式会社  
大阪市中央区本町2丁目6番8号

販売  
ファイザー株式会社  
東京都渋谷区代々木3-22-7



Mylan

外用局所収れん剤  
日本薬局方 酸化亜鉛  
酸化亜鉛  
「ファイザー」原末

1g/g

500g

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

1. 重度または広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕
2. 患部が湿潤している場合〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕

【組成・性状】

組成:1g中 日局 酸化亜鉛1g含有

性状:本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。  
本品は水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。  
本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。  
本品は空气中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【効能・効果】

軽度の皮膚病変の収れん・消炎・保護・緩和な防腐

【用法・用量】

外用散剤(散布剤)として15~100%  
軟膏剤・液剤(懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等)として2~60%  
上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1~数回患部に適用する。



調剤用<調剤包装単位用コード>



(01)04987114206596

日本薬局方 酸化亜鉛  
酸化亜鉛「ファイザー」原末

2019年6月改訂(第9版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	23100AMX00088
薬価収載	2019年6月
販売開始	1951年7月
再評価結果	1979年2月

貯法:気密容器、室温保存

製造番号

使用期限

流通用  
<販売包装単位用コード>

1g/g