

劇薬

ヨウ素剤  
日本薬局方 ヨウ化カリウム

# ヨウ化カリウム<sup>〔ホエイ〕</sup>

Potassium Iodide

貯法：遮光、気密容器、室温保存  
使用期限：5年  
（容器に表示の使用期限内  
に使用すること）

承認番号	16100AMZ00624
薬価収載	1950年9月 （健保等一部限定適用）
販売開始	1954年10月
再評価結果	1985年7月
効能追加	2013年9月

- ※※【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
1. 本剤の成分又はヨウ素に対し、過敏症の既往歴のある者
  - ※※ 2. 肺結核の患者（放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減の場合を除く）〔結核病巣組織に集まりやすく再燃させるおそれがある。〕

## 【組成・性状】

組成

販売名	ヨウ化カリウム <sup>〔ホエイ〕</sup>
成分・含量 (1g中)	日局 ヨウ化カリウム1g

製剤の性状

本剤は無色若しくは白色の結晶又は白色の結晶性の粉末である。

## ※※【効能・効果】

1. 甲状腺腫（ヨード欠乏によるもの及び甲状腺機能亢進症を伴うもの）
2. 下記疾患に伴う喀痰咯出困難  
慢性気管支炎  
喘息
3. 第三期梅毒
4. 放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減

## ※※【用法・用量】

1. の効能・効果に対し  
ヨード欠乏による甲状腺腫には、ヨウ化カリウムとして1日0.3～1.0mgを1～3回に分割経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。  
甲状腺機能亢進症を伴う甲状腺腫には、ヨウ化カリウムとして1日5～50mgを1～3回に分割経口投与する。  
この場合は適応を慎重に考慮すること。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。
2. 3. の効能・効果に対し  
慢性気管支炎及び喘息に伴う喀痰咯出困難並びに第三期梅毒には、ヨウ化カリウムとして通常成人1回0.1～0.5gを1日3～4回経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。
4. の効能・効果に対し  
放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減には、ヨウ化カリウムとして通常13歳以上には1回100mg、3歳以上13歳未満には1回50mg、生後1ヵ月以上3歳未満には1回32.5mg、新生児には1回16.3mgを経口投与する。

### ※※〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

1. 食直後の経口投与により、胃内容物に吸着されることがあるので、注意すること。また、制酸剤、牛乳等との併用は胃障害を軽減させることができる。
- ※※ 2. 放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減の場合、国等の指示に従い投与すること。

## ※※【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）  
(1) 甲状腺機能亢進症の患者〔ヨウ素誘発甲状腺腫が生じるおそれがある。〕

- (2) 甲状腺機能低下症の患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕
- (3) 腎機能障害のある患者〔血清カリウム濃度が過剰になり、症状が悪化するおそれがある。〕
- (4) 先天性筋強直症の患者〔カリウムにより、症状が悪化するおそれがある。〕
- (5) 高カリウム血症のある患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕
- (6) 低補体血症性蕁麻疹様血管炎の患者又は既往歴のある者〔過敏症状が生じるおそれがある。〕
- ※※(7) 肺結核の患者（放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減の場合）〔結核病巣組織に集まりやすく再燃させるおそれがある。〕
- (8) ヨード造影剤過敏症の既往歴のある者
- (9) ジューリング疱疹状皮膚炎の患者又は既往歴のある者〔過敏症状が生じるおそれがある。〕

## 2. 重要な基本的注意

- (1) 本剤を長期連用する場合には定期的に血清カリウム濃度を測定することが望ましい。
- (2) <sup>131</sup>I療法を行う場合には、その1週間前に本剤の投与を中止すること。（「8. 臨床検査結果に及ぼす影響」の項参照）

## 3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム含有製剤 カリウム貯留性利尿剤 エプレレノン	併用により、高カリウム血症を起こすことがあるので、血清カリウム濃度を測定するなど慎重に投与すること。	本剤との併用により相加的に作用し、高カリウム血症をきたす可能性がある。
リチウム製剤	併用により、甲状腺機能低下作用、甲状腺腫発症作用を増大させることがあるので、脳下垂体-甲状腺反応の変化、甲状腺機能を測定するなど慎重に投与すること。	両剤とも甲状腺機能低下作用があるため併用により相加的な甲状腺機能低下作用があらわれることがある。
抗甲状腺薬 チアマゾール プロピルチオウ ラシル	併用により、甲状腺機能低下と甲状腺腫生成作用を増強させることがある。このため定期的に甲状腺-脳下垂体反応の変化を調べ基準になる甲状腺機能を測定すること。	両剤とも甲状腺機能低下作用があるため併用により相加的な甲状腺機能低下作用があらわれることがある。
ACE阻害剤 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 アリスクリンフマル酸塩	併用により、結果的に高カリウム血症を生じることがある。このため血清カリウム濃度をモニタリングすること。	これらの薬剤はレニン・アンジオテンシン系に作用し、アルドステロンの分泌を低下させるため、カリウム排泄を減少させる。このため併用により高カリウム血症を生じることがある。

#### 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

##### (1) 重大な副作用（頻度不明）

長期連用により次のような症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。

- 1) ヨウ素中毒：結膜炎、眼瞼浮腫、鼻炎、喉頭炎、気管支炎、声門浮腫、喘息発作、前額痛、流涎、唾液腺腫脹、耳下腺炎、胃炎等の症状があらわれることがある。さらに中毒症状が進行すると、発疹、面皰、せつ、蕁麻疹、水疱、微熱、甲状腺腫、粘液水腫等の症状があらわれることがある。
- 2) ヨウ素悪液質：皮膚の粗荒、体重減少、全身衰弱、心悸亢進、抑うつ、不眠、神経過敏、性欲減退、乳房の腫大と疼痛、骨盤痛があらわれることがある。

##### (2) その他の副作用

種類	頻度	頻度不明
過敏症 <sup>※</sup>	発疹等	
消化器	悪心・嘔吐、胃痛、下痢、口腔・咽喉の灼熱感、金属味覚、歯痛、歯肉痛、血便（消化管出血）等	
その他	甲状腺機能低下症、頭痛、息切れ、かぜ症状、不規則性心拍、皮疹、原因不明の発熱、首・咽喉の腫脹等	

注) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。

#### 5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合に投与し、原則として反復投与を避けること。〔本剤は胎盤関門を通過し、胎児の甲状腺腫及び甲状腺機能異常を起こすことがある。〕
- (2) 妊娠後期に本剤を投与した妊婦より産まれた新生児には、甲状腺機能検査を実施し、甲状腺機能の低下を認めた場合には、甲状腺ホルモン補充療法等の適切な処置を行うこと。〔妊娠後期に投与した場合、新生児において、甲状腺機能の低下により知的発達に影響を及ぼすおそれがある。〕
- (3) 授乳中の婦人には本剤投与中及び投与後一定期間は授乳を避けさせること。〔母乳中への移行が認められ、乳児に皮疹や甲状腺機能抑制を起こすことがある。〕

#### 7. 小児等への投与

- (1) 皮疹や甲状腺機能抑制を起こすことがある。
- (2) 新生児には原則として反復投与を避けること。また、新生児への投与後には、甲状腺機能を検査し、甲状腺機能の低下を認めた場合には、甲状腺ホルモン補充療法等の適切な処置を行うこと。〔新生児において、甲状腺機能の低下により知的発達に影響を及ぼすおそれがある。〕

#### 8. 臨床検査結果に及ぼす影響

放射性ヨウ素摂取率検査を行う場合には、その1週間前に本剤の投与を中止すること。〔ヨウ化カリウム中のヨウ素は放射性ヨウ素の摂取率を低下させ、また、検査結果に影響を及ぼすことがある。〕

#### 【薬効薬理】

甲状腺機能に対し二方向性に作用する。甲状腺機能低下時にはヨウ素により機能が亢進するが、機能亢進時にはヨウ素はcAMPを介する甲状腺ホルモンの作用を抑制する。臨床的には後者が利用され、甲状腺機能亢進を伴う甲状腺腫に用いられる。また、ヨウ素の気管支粘膜分泌促進作用を利用して去痰薬としても用いられる。<sup>1)</sup>

#### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：〔日局〕ヨウ化カリウム（Potassium Iodide）

化学名：Potassium iodide

分子式：KI

分子量：166.00

性状：本品は無色若しくは白色の結晶又は白色の結晶性の粉末である。

本品は水に極めて溶けやすく、エタノール（95）にやや溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品は湿った空气中でわずかに潮解する。

#### \*\*\*【取扱い上の注意】

酸類、酸化剤によりヨウ素を析出するので、水道水中にある遊離塩素には注意を要する。

#### 【包装】

500 g

#### \*\*\*【保険給付上の注意】

本剤を「放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減」に使用した場合、保険給付されません。

#### 【主要文献】

1) 第十六改正日本薬局方解説書：C-5026，廣川書店，2011

#### \*【文献請求先】

ファイザー株式会社 製品情報センター  
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7  
学術情報ダイヤル 0120-664-467  
FAX 03-3379-3053



製造販売元  
マイラン製薬株式会社  
大阪市中央区本町2丁目6番8号

\*販売  
ファイザー株式会社  
東京都渋谷区代々木3-22-7

