



貯法	室温保存
使用期限	外箱等に最終年月表示

アレルギー性疾患治療剤

承認番号	30mg : 22500AMX00285000 60mg : 22500AMX00286000
薬価収載	2013年6月
販売開始	2013年6月

日本薬局方 フェキソフェナジン塩酸塩錠  
**フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」**  
FEXOFENADINE HCl Tablets 30mg「MEIJI」  
**フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」**  
FEXOFENADINE HCl Tablets 60mg「MEIJI」

**禁忌**(次の患者には投与しないこと)  
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

**【組成・性状】\***

**(1)組成**

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」又はフェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」は、1錠中にそれぞれ下記の成分を含有する。

販売名	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」
有効成分	30.0mg	60.0mg
添加物	結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、クロスカルメロースナトリウム、ポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、三酸化鉄、黄色三酸化鉄	

**\*(2)製剤の性状**

販売名	剤形	色	外形			識別コード
			表	裏	側面	
* フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」	フィルムコーティング錠	ごくうす いだいだ い色				MS 056
			直径	厚さ	重量	
			6.6mm	3.6mm	103.7mg	
* フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」	フィルムコーティング錠	うすい だいだ い色				MS 057
			直径	厚さ	重量	
			8.1mm	4.6mm	206.0mg	

**【効能・効果】**

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒

**【用法・用量】**

通常、成人にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。通常、7歳以上12歳未満の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回30mgを1日2回、12歳以上の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。なお、症状により適宜増減する。

**【使用上の注意】**

**(1)重要な基本的注意**

- 1)本剤を季節性の患者に投与する場合は、好発季節を考慮して、その直前から投与を開始し、好発季節終了時まで続けることが望ましい。
- 2)本剤の使用により効果が認められない場合には、漫然と長期にわたり投与しないように注意すること。

**(2)相互作用**

**【併用注意】**(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
制酸剤(水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤)	本剤の作用を減弱させることがあるので、同時に服用させないなど慎重に投与すること。	水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウムが本剤を一時的に吸着することにより吸収量が減少することによるものと推定される。
エリスロマイシン	本剤の血漿中濃度を上昇させるとの報告がある。	P糖蛋白の阻害による本剤のクリアランスの低下及び吸収率の増加に起因するものと推定される。

**(3)副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

**1)重大な副作用(頻度不明)**

- ①**ショック、アナフィラキシー**：ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、血圧低下、意識消失、血管浮腫、胸痛、潮紅等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- ②**肝機能障害、黄疸**：AST(GOT)、ALT(GPT)、 $\gamma$ -GTP、Al-P、LDHの上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- ③**無顆粒球症、白血球減少、好中球減少**：無顆粒球症、白血球減少、好中球減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2) その他の副作用

種類\頻度	頻度不明
精神神経系	頭痛、眠気、疲労、倦怠感、めまい、不眠、神経過敏、悪夢、睡眠障害、しびれ感
消化器	嘔気、嘔吐、口渇、腹痛、下痢、消化不良、便秘
過敏症 <sup>注1)</sup>	血管浮腫、そう痒、蕁麻疹、潮紅、発疹
肝臓 <sup>注2)</sup>	AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇
腎臓・泌尿器	排尿困難、頻尿
循環器	動悸、血圧上昇
その他	呼吸困難、味覚異常、浮腫、胸痛、月経異常

注1) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。  
 注2) このような異常があらわれた場合には、減量、休薬等の適切な処置を行うこと。

(4) 高齢者への投与

高齢者では腎機能が低下していることが多く、腎臓からも排泄される本剤では血中濃度が上昇する場合がありますので、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。

(5) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕
- 2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔動物実験(ラット)で乳汁中へ移行することが報告されている。〕

(6) 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

(7) 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤は、アレルゲン皮内反応を抑制するため、アレルゲン皮内反応検査を実施する3～5日前から本剤の投与を中止すること。

(8) 過量投与

過量投与に関する報告は限られており、外国での過量服用症例報告には用量が不明な症例が多いが、最も高用量を服用した2例(1800～3600mg)では、症状はないかあるいはめまい、眠気及び口渇が報告されている。過量投与例においては、吸収されずに残っている薬物を通常の方法で除去すること及び、その後の処置は対症的、補助的療法を検討すること。なお、本剤は血液透析によって除去できない。

(9) 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するように指導すること。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

【薬物動態】

(1) 生物学的同等性試験<sup>1,2)</sup>

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(フェキソフェナジン塩酸塩として60mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

また、フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。




図 60mg錠投与時の血漿中未変化体濃度推移

表 薬物動態パラメータ

	被験者数	判定パラメータ		参考パラメータ	
		AUCt (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」	32	1779 ± 658	285 ± 127	2.2 ± 1.2	4.9 ± 0.6
標準製剤(錠剤、60mg)	32	1884 ± 696	314 ± 166	2.0 ± 1.2	4.9 ± 0.5

Mean ± S. D.

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(2) 溶出挙動<sup>3)</sup>

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」及びフェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」は、日本薬局方医薬品各条に定められたフェキソフェナジン塩酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

【有効成分に関する理化学的知見】

性状：フェキソフェナジン塩酸塩は白色の結晶性の粉末である。

本品はメタノールに極めて溶けやすく、エタノール(99.5)にやや溶けやすく、水に溶けにくい。

本品のメタノール溶液(3→100)は旋光性を示さない。本品は結晶多形が認められる。

一般名：フェキソフェナジン塩酸塩


Fexofenadine Hydrochloride

化学名：2-(4-|(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl) piperidin-1-yl] butyl] phenyl)-2-methylpropanoic acid monohydrochloride

分子式：C<sub>32</sub>H<sub>39</sub>NO<sub>4</sub>・HCl

分子量：538.12

構造式：



及び鏡像異性体

【取扱い上の注意】

安定性試験<sup>4,5)</sup>

包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」及びフェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包 装】\*\*

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」

PTP包装 100錠(10錠×10シート)

\*\*フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」

\* PTP包装 100錠(10錠×10シート)

【主要文献】

- 1) フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」の生物学的同等性試験に関する資料(社内資料)
- 2) フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」の溶出性(生物学的同等性試験)に関する資料(社内資料)
- 3) フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg・60mg「明治」の溶出性(日本薬局方溶出試験)に関する資料(社内資料)
- 4) フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」の安定性に関する資料(社内資料)
- 5) フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」の安定性に関する資料(社内資料)

【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室

〒104-8002 東京都中央区京橋2-4-16

フリーダイヤル(0120)093-396 電話(03)3273-3539

FAX(03)3272-2438